

Veckorapport v 37 (1) – Öväntat stor inflygning av rapsjordloppa

Inflygningen av rapsjordloppan har ökat ytterligare i flera fält. Fjorton av fälten har nu passerat tröskelvärdet för larvskador. Det varma vädret är gynnsamt för många insekter, kontrollera därför även fälten för förekomst av larver av kålmal och kålbladstekel, se växtskyddbrev nr 29. Minor av rapsflugan/rapsstjälkflugan kan ses på en del blad, men saknar oftast betydelse.

Riktvärde gnagskador: ca 10 % uppäten bladyta, fram till 2-4 örtblad.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor.

För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärd.

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål. Antal rapsjordloppor / 10 dm ² och dygn					Ackumulerad fångst /10dm ²
		29/8	1/9	5/9	9/9	12/9	
Nordvästra Skåne							
Viken	15	2,4	16,2	5,9	13,6	4,6	149
Kattarp	14	1,1	5,7	3,0	3,5	3,9	63
Åstorp	15	2,4	12,3	4,6	8,8	5,6	121
Häljarp	13	0,0	3,1	2,0	38,2	20,7	215
Lund/Mellanskåne							
Löberöd	13	2,1	0,4	0,0	3,1	4,3	42
Furulund	14	1,9	5,7	6,9	5,7	6,9	103
Lund	13	0,7	1,3	1,0	0,4	0,7	13
Genarp	12	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	3
Kyrkheddinge	15	0,0	3,1	0,7	0,4	1,3	18
Sydvästra Skåne							
Staffanstorps	13	0,8	0,4	0,7	0,0	2,6	18
Gessie	13	0,2	0,4	5,3	7,0	14,8	104
Bodarp	14	5,3	1,3	12,5	4,8	7,6	130
Maglarp	14	1,5	0,9	5,9	3,1	12,5	95
Hemmesdynge	12	3,7	4,4	11,8	0,0	13,2	136
Skivarp	12	0,0	0,4	2,3	0,9	2,6	24
Sydöstra Skåne							
Charlottenlund	14	0,2	4,8	5,3	25,0	11,5	158
Sandby Gård	13	0,4	3,1	4,9	6,6	9,9	91
Gärnäs	13	0,8	6,6	5,3	5,7	5,9	87
Nordöstra Skåne							
Kristianstad	13	0,0	0,9	0,7	11,8	3,6	55
Blekinge							
Bräkne-Hoby	14	0,2	0,4	5,3	6,1	10,5	84

Utvecklingsstadier: 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.

Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden