

Veckorapport – Alnarp vecka 16

Höstvete DC 23 (21-30) 73 fält

Enstaka angrepp av gulrost finns noterad i sorten Norin (3 fält), Julius och Praktik. Svartpricksjuka finns på de äldsta bladen i nästan alla graderade fält vilket är normalt under tidig vår. Enstaka angrepp av mjöldagg förekommer.

Råg DC 31 (23-32) 14 fält

Mindre angrepp av mjöldagg förekommer i några fält. Sköldfläcksjuka förekommer i små mängder i ca 2/3 av fälten. Brunrost är noterad endast i ett fält i Mellanskåne.

Rågvete DC 30 (23-30) 11 fält

Sporulerande gulrost har hittats i ca hälften av de graderade fälten. Gulrost finns i flertalet sorter t ex Seguenz, Empero, Remiko och Tulus. Högsta angreppsnivån var 22 % angripna blad (Österlen). Mindre angrepp av mjöldagg finns noterat i flertalet fält. Angreppen av bladfläckar och sköldfläcksjuka är små.

Höstkorn DC 30 (23-30) 15 fält

Mindre angrepp av kornrost är noterad i tre fält i sorterna Wootan och Apropos. Mindre förekomst av mjöldagg förekommer i ca hälften av fälten. Förekomsten av sköldfläcksjuka är mycket liten. Fysiologiska fläckar (ofta mörkt bruna) förekommer i många av fälten, främst på de äldre bladen.

Höstraps DC 53 (52-55) 6 fält

Angrepp av ljus bladfläcksjuka förekommer i en del fält. Bladangrepp kan förväxlas med frost eller gödningsskador. Det kyligare vädret gör att det nu inte är många rapsbaggas i rörelse och inga rapsbaggas noterades i prognosrutorna. Gulskålar är placerade i 6 fält. Endast några enstaka fyrkantade rapsvivar är hittills noterade.

Vårsäd (0-11)

Tidigt sådda fält uppkomna och senare sådder under uppkomst. Inget att rapportera.

Fritfluga Daggrader - temperatursummor 18 april

Helsingborg 9, Hörby 10, Kallinge 9, Malmö 9 och Torup 7.

Växtskyddscentralen Alnarp