

Veckorapport v 36 (2) – Rapsjordloppa, larver av kålmal och kålbladstekel

Inflygningen av rapsjordloppan pågår och har ökat i de flesta fälten. Nio av fälten har nu passerat tröskelvärdet för larvskador. Det varma vädret är gynnsamt för många insekter, kontrollera därför även fälten för förekomst av larver av kålmal och kålbladstekel, se växtskyddbrev nr 29. Mycket myggor och småflugor har noterats i skållarna, men dessa betyder sällan så mycket.

Riktvärde gnagskador: ca 10 % uppåten bladyta, fram till 2-4 örtblad.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor.

För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål Antal rapsjordloppor / 10 dm ² och dygn				Ackumulerad fångst /10 dm ²
		29/8	1/9	5/9	9/8	
Nordvästra Skåne						
Viken	15	2,4	16,2	5,9	13,6	130
Kattarp	13	1,1	5,7	3,0	3,5	48
Åstorp	15	2,4	12,3	4,6	8,8	99
Häljarp	12	0,0	3,1	2,0	38,2	131
Lund/Mellanskåne						
Löberöd	13	2,1	0,4	0,0	3,1	25
Furulund	14	1,9	5,7	6,9	5,7	75
Lund	12	0,7	1,3	1,0	0,4	11
Genarp	10	0,0	0,0	0,0	0,4	1
Kyrkheddinge	13	0,0	3,1	0,7	0,4	13
Sydvästra Skåne						
Staffanstorp	12	0,8	0,4	0,7	0,0	8
Gessie	12	0,2	0,4	5,3	7,0	45
Bodarp	14	5,3	1,3	12,5	4,8	100
Maglarp	13	1,5	0,9	5,9	3,1	45
Hemmesdyngge	12	3,7	4,4	11,8	0,0	83
Skivarp	11	0,0	0,4	2,3	0,9	13
Sydöstra Skåne						
Charlottenlund	14	0,2	4,8	5,3	25,0	112
Sandby Gärd	12	0,4	3,1	4,9	6,6	51
Gärnsås	13	0,8	6,6	5,3	5,7	63
Nordöstra Skåne						
Kristianstad	12	0,0	0,9	0,7	11,8	41
Blekinge						
Bräkne-Hoby	13	0,2	0,4	5,3	6,1	42

Utvecklingsstadier: 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.

Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden