

**FODERTILLSATSER**

EEG-nr	Tillsats (Specifikt namn)	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximi- ålder	Lägsta innehåll	*Högsta innehåll	Övriga bestämmelser
<b>D. Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser</b>							
E 755	Metiklorpindol	3,5-Diklor-2,6-dimetyl-4-pyridinol	Slaktkycklingar, pärlhöns	-	125	125	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt och inte heller till värfärdiga djur.
			Kaniner	-	125	200	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt.
E 756	Dekokinat	3-Etoxykarbonyl-4hydroxi-6-decyloxi-7-etoxikinolin	Slaktkycklingar	-	20	40	Får ej användas de sista tre dagarna före slakt.
E 757	Monensin natrium	C <sub>36</sub> H <sub>61</sub> O <sub>11</sub> Na (naturiumsalt av monokarboxylsyra-polyeter fra mställt av <i>Streptomyces cinnamomensis</i> )	Slaktkycklingar	-	100	125	Får ej användas de sista tre dagarna före slakt. Ange i bruksanvisningen: "Farligt för hästdjur" "Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig användning med vissa läkemedel (t.ex. tiamulin) kan vara kontraindicerat".
			Kycklingar för uppfödning till värphöns	16 veckor	100	120	Ange i bruksanvisningen: "Farligt för hästdjur" "Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig användning med vissa läkemedel (t.ex. tiamulin) kan vara kontraindicerat".
			Kalkoner	16 veckor	90	100	Får ej användas de sista tre dagarna före slakt. Ange i bruksanvisningen: "Farligt för hästdjur" "Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig

E 758	Robenidin	1,3-Bis [(4-kloro-benzyliden) amino]-guanidinhydroklorid	Slaktkycklingar, kalkoner	-	30	36	användning med vissa läkemedel (t.ex. tiamulin) kan vara kontraindicerat". Får ej användas de sista fem dagarna före slakt.
			Kaniner för köttproduktion	-	50	60	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt.
E 763	Lasalocid natrium	C <sub>34</sub> H <sub>53</sub> O <sub>8</sub> Na (natriumsalt av mono-karboxylsyra-polyeter framställt av <i>Streptomyces lasaliensis</i> )	Slaktkycklingar	-	75	125	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt. Ange i bruksanvisningen: " Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig användning med vissa läkemedel kan vara kontraindicerat.
			Kycklingar för uppfödning till värphöns	16 veckor	75	125	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt. Ange i bruksanvisningen: " Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig användning med vissa läkemedel kan vara kontraindicerat.
E 764	Halofuginon	trans-7-Bromo-3-[3-hydroxi-2-piperidyl) acetyl]-6-kloro-4(3H) kinajolinon	Slaktkycklingar	-	2	3	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt.
			Kalkoner	12 veckor	2	3	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt.
E 765	Narasin	C <sub>43</sub> H <sub>72</sub> O <sub>11</sub> (monokarboxyl-syrapolyeter framställt av <i>Streptomyces aureofaciens</i> )	Slaktkycklingar	-	60	70	Får ej användas de sista fem dagarna före slakt. Ange i bruksanvisningen: "Farligt för hästdjur"

E 766	Salinomycin natrium	C <sub>42</sub> H <sub>69</sub> O <sub>11</sub> Na (natruimsalt av mono-karboxylsyrapolyeter framställt av <i>Streptomyces albus</i> ) Elafylin innehåll mindre än 42 mg per kg salinomycin natrium. 17 epi-20-desoxy-salinomycin innehåll mindre än 40 g per kg av salinomycin natrium.	Slaktkycklingar	-	50	70	<p>”Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig användning av vissa läkemedel (t.ex. tiamulin) kan vara kontraindicerat.</p> <p>Får ej användas de sista fem dagarna före slakt.</p> <p>Ange i bruksanvisningen: ”Farligt för hästdjur” Detta foder innehåller en jonofor. Samtidig användning av vissa läkemedel (t.ex. tiamulin) kan vara kontraindicerat.</p>
-------	---------------------	--	-----------------	---	----	----	--