

Rådgivningsenheten Norr  
Växtskyddscentralen

**Hej!**

Uppsala 11 juli 2017

Förra veckans graderingsresultat visade på ökade svampangrepp i de flesta grödorna, till följd av ett väder som bjöd på både värme och en del nederbörd. Störst ökning av svampangrepp såg vi i höstvetet, vilket i snitt befann sig i DC 75. Löss fanns det fortsatt mycket av i ärter, och fortsatt lite av i övriga grödor.

För dig som har stråsäd som visar sig ha uppnått DC 75 nästa vecka så blir det säsongens sista gradering. För de fält som inte utvecklats så långt skulle vi vilja se resultatet från ytterligare någon vecka. Svampsjukdomarnas utveckling har varit långsam i år och det ska bli intressant att följa den ända till slutet.

**Graderingar vecka 29.** Det är inte nödvändigt att få in resultaten till tisdag kl. 12 de kommande veckorna. Vi ser hellre att din sista gradering görs någon dag senare än att den inte blir gjord alls.

**Höstvete:**

**Mjöldagg, bladfläckar** (ange vilka), **brunrost, gulrost, bladlöss.** Skicka in **axprover för vetemygga.** Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.

**Stråknäckarprover:** Gräv upp 50 plantor försiktigt och se till att få med rötterna. Klipp av strået ca 25 cm från basen och ta bort lös jord. Rötterna får inte ruttna så förvara dem torrt och lämna till oss vid tillfälle. Märk proverna med fältnummer, gröda och datum.

**Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost, löss.**

Om kornet har gått i ax görs en uppskattning av **flygsot**. Räkna antalet angripna plantor i en ruta på 1x10m på några olika ställen i fältet. Räkna ut antalet angripna plantor per kvadratmeter och notera i anteckningsrutan.

**Havre: Mjöldagg, bladfläckar, kronrost (notera även om du ser svartrost på bladslidorna), löss. Flygsot** (se instruktion under Korn).

**Vårvete:**

**Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. Tripsskador** graderas *en gång* i DC 71–79. Gradera minst 25 strån och ange procent skadade. Som skada räknas när mer än halva bladslidans omkrets är gulfärgad. Skicka in **axprover för vetemygga** vid DC 75 (när kärnan nått full längd). Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.

**Ärter:** Ingen gradering aktuell men **baljprover** ska tas in från den obehandlade rutan. När baljorna är fullmatade, helst 1-2 veckor före skörd, så tar du baljor från 50 plantor. Om du har fler än 8 baljor per planta kan det räcka med att du tar från 25 plantor. Lägg baljorna i en plastpåse och frys in direkt. *Provet ska märkas med antal plantor.* Lämna till oss vid tillfälle eller meddela oss om vi ska komma och hämta dem.

**Åkerböna:** Ingen gradering aktuell men Växtskyddscentralen vill ta in **baljprover** från den obehandlade rutan före skörd.



*Tripsskador* graderas i vete, råg, rågvete och höstkorn i slutet av säsongen. Räkna skador på 25 strån och ange antal skadade strån i procent. Som skadat strå räknas då bladslidan samt minst halva varvet runt strået är gulfärgat.

Vänliga hälsningar

Lina, Anders, Hanna och Sanna

**E-post:** [vsc.uppsala@jordbruksverket.se](mailto:vsc.uppsala@jordbruksverket.se)

[lina.norrlund@jordbruksverket.se](mailto:lina.norrlund@jordbruksverket.se)

072-222 68 23

[anders.lindgren@jordbruksverket.se](mailto:anders.lindgren@jordbruksverket.se)

070-662 18 85

[hanna.olsson@jordbruksverket.se](mailto:hanna.olsson@jordbruksverket.se)

073-404 25 90

[sanna.krugerpersson@jordbruksverket.se](mailto:sanna.krugerpersson@jordbruksverket.se)

076-607 01 63