



## Anvisningar för höstkorn

Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem slumpvisa platser, stationer.

**Bladsvampar:** Strån huvudskott från fem stationer graderas. Gradera de tre översta bladen på varje strå tills ni uppnått 50 blad (minst 17 strån). Skilj ej på de olika bladnivåerna. Bladen räknas då de är fullt utvecklade, dvs när snärpet syns. Vissnande blad medräknas om orsaken säkert kan hänföras till svampangrepp. Avräkna endast symptom som säkert orsakats av svamp. Är man osäker räknas endast bruna eller beige bladfläckar som är minst 2 mm stora och som har en gul bård omkring. Förekomsterna av sköldfläcksjuka varierar ofta inom den obehandlade rutan, vilket gör det viktigt att avräkningen görs slumpvis. Kornrost och gulrost särskiljs inte, men ange vilken som dominerar. För mjöldagg i tidigt stadium, anteckna om det är gammal eller ny mjöldagg.

**Bladlöss:** Drag försiktigt upp knippen av strån och räkna antalet löss på fem strån (strå, blad, ax) per station (totalt 25 strån). Notera antalet löss i medeltal per strå för respektive art.

Påträffas mycket grönstrimmig gräsbladlus noteras detta under anteckningar.

**Trips:** Granska 5 strån per station. Titta först på stråets utsida, drag därefter försiktigt bort översta bladslidan och undersök strået och insidan av bladslidan. Endast föräldragenerationen, som är svart-bruna, räknas. Ange trips i medeltal per strå. Trips avräknas endast en gång. Detta görs tidigast i DC 43, senast när halva axet gått ur holk.

**Tripssymptom:** graderas en gång i DC 71-79. Fem strån per station graderas på översta bladet och bladslidan. Ett symptom räknas när mer än halva bladslidans omkrets är gulfärgad. Notera % strån med symptom.

I kolumnen "**anteckningar**" noteras övriga skadegörare. Skriv då skadegöraren följt av graderingsresultatet.