



Vid certifiering av stråsäd tillämpar Utsädesenheten följande gränser för betning:

Höstråg, Höstrågvete, Höstvete och Höstspeltvete

<i>Fusarium spp, Microdochium nivale</i> <i>Septoria spp, Bipolaris sorokiniana</i>	> 30 %	Betning nödvändig
--	--------	-------------------

Höstkorn

<i>Fusarium spp</i>	> 25 %	Betning nödvändig
<i>Bipolaris sorokiniana</i>	> 20 %	Betning nödvändig
<i>Drechslera spp</i>	>15 %	Betning nödvändig
Total förekomst av ovannämnda sjukdomar	>35 %	Betning nödvändig

Vårvete, Durumvete, Vårråg

<i>Fusarium spp, Septoria spp,</i> <i>Bipolaris sorokiniana</i>	>30 %	Betning nödvändig
--	-------	-------------------

Vårkorn

<i>Fusarium spp</i>	>25 %	Betning nödvändig
<i>Bipolaris sorokiniana</i>	>20 %	Betning nödvändig
<i>Drechslera spp</i>	>15 %	Betning nödvändig
Total förekomst av ovannämnda sjukdomar	>35 %	Betning nödvändig

Havre

<i>Fusarium spp</i>	>20 %	Betning nödvändig
<i>Drechslera avenae</i>	>50 %	Betning nödvändig
Total förekomst av ovannämnda sjukdomar och <i>Bipolaris sorokiniana</i>	>60 %	Betning nödvändig

Betningkrav, som baseras på föranalys får grundas på högst 70 ton råvara. Observera att föranalysen skall vara officiellt provtagen eller provtagen av en provtagare som auktoriserats av Jordbruksverket.

Sotsjukdomar

Stinksot och Dvärgstinksot i Höstvetete och Höstspeltvetete

Stinksot

Utsädet får inte certifieras om det finns mer än 1000 sporer per gram. Utsäde med en förekomst av sporer av vanligt stinksot som understiger 1000 sporer per gram får certifieras om det betas med effektivt medel. Utsäde som certifieras utan betning får inte innehålla några stinksotsporer vid analys.

Dvärgstinksot

Utsädet får inte certifieras om det finns mer än 500 sporer per gram. Utsäde med en förekomst av sporer av dvärgstinksot som understiger 500 sporer per gram får certifieras om det betas med effektivt medel. Utsäde som certifieras utan betning får inte innehålla några dvärgstinksotsporer vid analys.

Förekommer både vanligt stinksot och dvärgstinksot i samma utsädesparti får högst 500 sporer av vardera sjukdomen förekomma per gram, för att utsädet skall få certifieras. Utsädet får då certifieras om det betas med effektivt medel.

Verksamma medel mot stinksot: Celest Extra Formula M, Celest Formula M, Cerall, Dividend Formula M, ThermoSeed

Verksamma medel mot dvärgstinksot: Celest Extra Formula , Dividend Formula M

Betningskrav, som baseras på föranalys får grundas på högst 70 ton råvara. Observera att föranalysen skall vara officiellt provtagen eller provtagen av en provtagare som auktoriserats av utsädeskontrollen

Flygsot (naket sot) på korn	Klass A	>0,1 %	Betning nödvändig
	Klass B	>0,2 %	Betning nödvändig
	Klass C1	>0,3 %	Betning nödvändig

Verksamt medel mot flygsot på korn: För närvarande finns inga godkända betningsmedel. (Rancona i-Mix har dock dispens t o m 2017-03-30)

Havreflygsot	Klass A, B >200 sporer/gram kärna
	Betning nödvändig

Verksamma medel mot havreflygsot: Celest Extra Formula M, ThermoSeed

Betningskrav för flygsot på korn och havreflygsot får grundas på en föranalys per odling. Fältbesiktningsnummer ska anges. Observera att föranalysen skall vara officiellt provtagen eller provtagen av en provtagare som auktoriserats av Jordbruksverket