

Veckorapport - Linköping vecka 36, 2019

Gulskålsfångster i höstraps

Inflygningen av rapsjordloppor fortsatte under förra veckan. Ett fält har kommit över det övre intervallet i bekämpningströskeln.

För att följa förekomsten och värdera behovet av bekämpning mot skador av rapsjordloppans larver räknar vi tillsammans med Lovang lantbrukskonsult och Svensk Raps insektsfångster. Fångstskålarna är utsatta i fält i Östergötlands-, Södermanlands- och Örebro län. Ytterligare fält kan komma till.

Rapsjordloppa

Rapsjordloppan kan orsaka två sorters skador, gnagskador vid uppkomst och utvintringsskador på grund av larvangrepp.

Riktvärde gnagskador: i medeltal mer än 10 % uppäten bladyta i tidiga utvecklingsstadier, fram till 2-4 utvecklade örtblad.

Bekämpningströskel larvskador: ca 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor. För att hindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Erfarenheter från de två senaste åren är att skadorna av rapsjordloppans larver varit obetydliga trots skålfångster högt över tröskelvärdet. Därför rekommenderar vi att skålfångsten ska ligga i det övre intervallet, runt 100 rapsjordloppor per 10 dm², innan du överväger en bekämpning.

Bekämpningen görs med en pyretroid.

Tabell 1. Skålfångster veckovis och den sammanlagda fångsten v34–36 2019

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Skålfångst / 10 dm ²							Ackumulerad fångst / 10 dm ² (senaste 3 veckor)
		20/8	26/8	2/9					
Östra Södermanland									
Nyköping	10	-	0	-					0
Jönåker	10	-	-	0					0
Västra Östergötland									
Fivelstad	12	0	38	26					64
Mjölby	13	0	12	0					12
Lönsås	12	-	8	55					63
Västra Stenby	12	-	1	25					26
Svanshals	14	0	11	66					77
Österstad	13	-	16	29					45
Hagebyhöga	12	0	16	35					51

