

## Växtskyddsbrev

2010-08-16

### Stor risk för sniglar i nysådd höstraps

#### Sniglarna gynnas

Det myckna regnandet den senaste tiden har gjort det svårt att så höstraps. Vädret har också gynnat sniglarna och därför är risken stor för angrepp i höstraps som etableras.

I höstoljeväxter kan skadorna bli omfattande eftersom plantornas tillväxtpunkt skadas, ibland redan före uppkomst. På lite större plantor syns skadorna som oregelbundna gnagskador på bladen och ofta syns de intorkade slemspåren.

Snigelskador är vanligast på lerjord med grov och kokig struktur. Växtrester på fältet ökar risken för skador och om förfrukten är vall eller träda. Fältkanter som gränsar till gräs, diken o. dyl. brukar också drabbas. Eftersom sniglar är känsliga för jordbearbetning innebär reducerad jordbearbetning också en ökad risk för angrepp.

**Rekommendation:** Pga regnig väderlek bedöms risken som mycket stor för snigelangrepp i höstraps. Rekommendationen är därför att bekämpa förebyggande i riskfält dvs fält med kokig struktur, där förfrukten är vall/träda och där det finns mycket växtrester. I dessa fält rekommenderas bekämpning med Mesurol eller Ferramol vid sådd eller strax efter. Dos i det lägre intervallet (se preparat nedan). Håll fältet under uppsikt och var uppmärksam på om sniglarna ätit upp preparatet och skador börjar synas, då det kan vara aktuellt att bekämpa en gång till.

I övriga fält kan man bedöma behovet av kemisk bekämpning genom att lägga ut ett flertal snigelfällor i fälten direkt efter sådd. Räkna av antalet döda sniglar under skivan dagen efter. I England används en snigel per fälla och dygn (med diametern 25 cm) som tröskelvärde för bekämpning i oljeväxter om vädret är regnigt vid och efter sådd. Slemspår i fält avslöjar också sniglarna. Kontrollera bäst på morgonen då slemspåren syns bäst.

**Preparat:** Bekämpning görs med Mesurol snigelgift 3-5 kg/ha eller Ferramol Snigel Effekt 8-20 kg/ha. Ferramol är ett järnfosfat som är mer skonsamt mot t ex dagmaskar än Mesurol. Det tar en tid innan sniglarna dör efter intag av Ferramol men de slutar äta ganska omgående och drar sig undan ner i jorden.

**Växtskyddscentralen, Skara**