

## Veckorapport – Linköping vecka 34

### Inventering av sniglar i höstraps.

Sju fält i Östergötland inventeras varje vecka sedan början av augusti. Två fällor läggs ut under ett dygn i varje fält. En av fällorna ligger i fältkanten och en ca 10 m in i fältet. Müsli används som bete under fällorna. Hittills har det varit mycket lite sniglar i de inventerade fälten.

Tabell 1. Antal sniglar per fälla och dygn (medel av två fällor)

Plats	1/8	8/8	15/8	22/8			
Linköping	0	0	0	0			
Mantorp	0	0	0	0			
Mjölby	0	0	0	0			
Väderstad	0	0	-	0			
Vadstena	0	0	-	0			
Fornåsa	0	4	0,5	0			
Borghamn	0	0	0	0			

### Skålfångst av Rapsjordloppa

Två gulskålar är utsatta i varje fält. För larvskador under vintern som påverkar övervintringen, finns ett tröskelvärde på 50-100 jordloppor per 10 dm<sup>2</sup> skålyta i ackumulerad fångst under en tre-veckorsperiod. Detta tröskelvärde säger inget om de direkta gnagskador som man kan få om det finns mycket rapsjordloppor i samband med uppkomst.

Tabell 2 . Fångst per 10 dm<sup>2</sup> gulskål

Plats	21/8						
Linköping	1,3						
Mantorp	8,9						
Mjölby	2,5						
Borghamn	3,8						

Växtskyddcentralen Linköping



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden