

Nr 4. Efterverkan av ogräsmedel

En del ogräsmedel har verkan på efterföljande gröda, speciellt gäller detta vid sådd efter en utvintrad gröda som har höstbehandlats. I tabellen listas begränsningar i grödval och rekommenderade åtgärder som gäller fram till dess att en valfri lantbruksgröda (VFL) kan odlas. Dessa gäller oavsett dos, om inte annat anges. Hänvisningar se sidan 2.

Höst 2013	Vår 2014	Höst 2014	Vår 2015	Höst 2015
Ogräsbekämpning i höstsäd	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsäd	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
1. Atlantis	h)		VFL	VFL
2. Bacara, upp till 1,25	b)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL
3. Cougar, upp till 1,5	a)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL
4. Bacara/Cougar +		+ Hussar	k)	VFL
5. Bacara/Cougar +		+ Monitor	Pløj före höstoljevaxter.	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.
6. Boxer	VFL			
7. Event Super	VFL			
8. Lexus	Endast vårvete.		i)	VFL
9. Diflanil	p)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter	
10. Legacy	VFL efter plöjning Stråsäd efter harvning		Harva noga och djupt före höstoljevaxter	
		11. Ally/Ally Class	f)	g)
		12. Atlantis	k)	VFL
		13. Attribut Twin	l)	VFL
		14. Bacara/Cougar	q)	VFL
		15. Broadway	VFL	
		16. Caliban Duo	Pløj före höstoljevaxter	VFL
		17. CDQ	r)	r)
		18. Diflanil	q	VFL
		19. Legacy	q	VFL
		20. Event Super	VFL	
		21. Hussar	k)	VFL
		22. Monitor	n)	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.
Ogräsbekämpning i höstoljevaxter	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/våroljevaxter	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
23. Butisan Top	c)		Direktsådd av höstsäd kan ske.	VFL
24. Kerb	d)		Pløj före höstsäd på lerfri jord.	VFL
25. Nimbus	e)		VFL	
		26. Butisan Top	Direktsådd av höstsäd kan ske.	VFL
		27. Nimbus	o)	VFL
		28. Fox	j)	VFL
		29. Galera	Stråsäd, höstoljevaxter	m)

Hänvisningar i tabellen på sid 1:

- a) Normalt kan vårvede eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning. Våroljeväxter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före sådd av vårvede eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.
- b) Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sätts. Harvning krävs före vårvede, havre och morötter. Plöjning krävs före våroljeväxter och klöver till frö. Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.
- c) Om bekämpning i augusti; VFL (inte sockerbetor) efter normal jordbearbetning, 5-10 cm djup. Undvik stråsäd på lätta jordar. Om bekämpning i september; kan endast våroljeväxter, lin, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas.
- d) Sådd av raps, majs, ärter, morötter, bönor eller lök kan göras. Inte stråsäd eller sockerbetor.
- e) Om bekämpning i augusti; VFL (inte sockerbetor eller lin) efter en normal jordbearbetning, 5-10 cm djup. Undvik stråsäd, framförallt havre, på lätta jordar. Bäst alternativ är våroljeväxter.
- f) Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan inte odlas.
- g) Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, majs eller lin kan odlas. Sockerbetor kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker och prydnadsväxter kan ej odlas.
- h) Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvede sås om det har gått minst 2 veckor efter en behandling med Atlantis.
- i) På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor och majs odlas.
- j) Minst 30 dagar bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av ny oljeväxtgröda. Om fältet plöjs kan oljeväxterna sås direkt utan väntetid. Minst 1 år bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av sockerbetor och ärter. Om fältet plöjts kan sockerbetor sås efter 100 dagar och ärter efter 150 dagar.
- k) Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter normala förhållanden.
- l) Plöj innan sådd av höstoljeväxter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan påverkas och plantantalet reduceras.
- m) Växtmaterial från en gröda som har behandlats med Galera och som inte har brutits ned kan skada en efterföljande känslig gröda, t ex ärt, bönor, lupin, potatis, morötter, sallat samt övriga baljväxter, korgblommiga och flockblommiga växter.
- n) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter.
- o) Lätt bearbetning ska utföras och sådd av höststråsäd tidigast 3 månader efter en behandling.
- p) Vårkorn och vårvede kan sås efter grundlig harvning. Potatis kan sättas efter en plöjning. Våroljeväxter, ärtor, bönor, lökväxter, klöver, betor ska undvikas vid omsådd.
- q) Harva noga och djupt före sådd av höstoljeväxter. Vid dos överstigande 0,3 Bacara/Cougar alternativt 0,1 Diflanil/Legacy plöj före höstoljeväxter.
- r) Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbetor, majs och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.