

ANVISNINGAR FÖR ÄRTER

Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem slumpvis utvalda platser, stationer. Även plantorna/stråna väljs slumpmässigt.

Bladmögel graderas på fem plantor per station. Graderas i procent angripna plantor. Då fler plantor än 70 % är angripna graderas även procent angripna blad. Bladmögel yttrar sig som bleka bladfläckar med gråviolett ludd på bladens undersida.

Ärtvivel. Ange procent blad med gnag. Gradera fem plantor per station. Notera i anteckningskolumnen när gnagen omfattar även de inre delarna av bladen.

Bladlöss. Räkna på fem toppskott per station. Ange antal löss per toppskott. Till en början håller sig lössen dolda innanför bladen i toppskotten. Kupa handen under skottet och knacka försiktigt på det. Lössen kan sedan lätt räknas i handen. Kontrollera om fler sitter kvar innanför bladen. Tänk på att lössen är mycket lättstörda.

Ärtvecklarprov. När baljorna är fullmatade, helst 1–2 veckor före skörd tas baljprov från 50 plantor. Vid hög skörd (mer än 8 baljor per planta) kan det räcka med baljor från 25 plantor. Frys baljorna omgående.

I "**Övrigt**"-kolumnen noteras övriga skadegörare. Skriv då skadegöraren följt av graderingsresultatet.

Utvecklingsstadium då olika skadegörare normalt graderas

	20	30	40	50	60	70	80	
Bladmögel	—————							
Ärtvivel	—————							
Bladlöss		—————						
Baljprov							—————	