

VÅROLJEVÄXTER

ÅR:

Fyll alltid i rutorna enligt

Siffra = % angrepp eller antal

0,01 = förekomst

0 = ingen förekomst

- = ej graderat

Jordloppor anges som procent plantor med gnagskador.

Skickas till:

Växtskyddscentralen


Fax: 018-12 34 10

vsc.uppsala@jordbruksverket.se

Namn, adress/gårdsnamn, telefonnummer	Fältnummer	Gårdsnummer
	Sort	Län
	Graderare	

Datum	Utv. st.	Rapsbagge ant/pl.	Jordloppa % angr. pl.	Klassning jordloppes-gnag	Kålbladlus ant/pl.	Övriga skadeg.		Anteckningar
						1	2	

SJV V 66 2013-03 PDF




ANVISNINGAR FÖR VÅROLJEVÄXTER

Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem olika stationer.

Jordloppor. Räkna av fem plantor per station. Ange hur många % av plantorna som har gnagskador. Bedöm gnagskadornas klassning enligt skissen.

PROCENT ANGRIPEN HJÄRTBLADSYTA



Trips. Granska både ovan- och undersidan av bladen på fem plantor per station. Vänd bladen försiktigt då tripsen lätt faller av. Notera antalet trips per planta.

Rapsbaggar. Räkna av fem plantor per station. Välj slumpmässigt ut var femte planta i raden. Anges som medeltal/planta.

Blygrå rapsvivel. Räkna av 10 plantor per station. Anges som medeltal/planta.

Skidgallmygga. Graderas en gång, ca tre veckor efter avslutad blomning. Räkna av fem plantor per station på fem olika stationer minst 30 m in i fältet. Välj slumpmässigt ut var femte planta i raden. Avräkna % angripna skidor på toppskottet samt de två översta sidogrenarna med skidor på. Endast skidor som okulärt kan fastställas vara angripna räknas. Vid angrepp blir skidorna uppsvällda och innehåller fullt med små gulvita larver.

Kålbladlus. Avräkningen från sent knoppstadium på 20 plantor per station. Ange % angripna plantor. Lössen sitter kolonivis i knopp- och blomregionen.

I "Övrigt"-kolumnen noteras övriga skadegörare. Skriv då skadegöraren följt av graderingsresultatet.