

HAVRE

ÅR:

Fyll alltid i rutorna enligt

Siffror = % angrepp eller antal

0,01 = förekomst

0 = ingen förekomst

- = ej graderat

Svampsjukdomar och bladminerare anges som % angripna blad på nivå 1-3. Ett blad anses som utvecklat när dess snärp kommit fram eller bladspetsen på nästa börjar synas.

Skickas till:

Växtskyddscentralen

Fax: 018-12 34 10

vsc.uppsala@jordbruksverket.se

Namn, adress/gårdsnamn, telefonnummer	Fältnummer	Gårdsnummer
	Sort	Län
	Graderare	

Datum	Utv. st.	Prim.- ang	Blad- fläckar	Kron- rost	Frit- fluga	Bladlöss ant/strå			Bladminerare		Övr. skadeg.		Anteckningar
						H.b.	S.b.	G.b.	Stick	Minor	1	2	

ANVISNINGAR FÖR HAVRE

Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem slumpvis utvalda platser i rutan, stationer.

Bladsvampar. Strån från fem stationer graderas. Gradera de tre översta bladen på varje strå tills ni uppnått 50 blad (minst 17 strån). Skilj ej på de olika bladnivåerna. Bara fullt utvecklade blad graderas. Vissnande blad medräknas om orsaken säkert kan hänföras till svampangrepp.

Bladfläcksvampar. Avräkna endast symptom som säkert orsakats av svamp. Notera under Övriga skadegörare om det förekommer bladbakterios.

Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räkna friska respektive angripna plantor på 0,5 radmeter per station. Angreppen hittas nästan alltid på det först uppkomna bladet. Ange procent smittade plantor.

Bladlöss. Drag försiktigt upp knippen av strån och räkna antalet löss på fem strån (strå, blad, ax) per station. Ange antalet löss i medeltal per strå för respektive art. Notera hur stor andel som sitter under markytan.

Efter axgång finner man **sädesbladlöss (S.b.)** främst på ax och flaggblad. **Gräsbladlöss (G.b.)** hittas nere i beståndet och där framförallt på undersidan av bladen. **Havrebladlöss (H.b.)** finns oftast på nedre delen av strået.

Fritfluga graderas på 20 plantor i rad per station. Ange i procent hur många plantor som har döda huvudskott.

Minerarfluga graderas på 50 blad precis som bladfläckar. Under bestockningen graderas näringssticken och från axgången graderas minorna.

Kronrost. Kronrosten angriper normalt bladskivorna. Gradera på 50 blad 1–3 och ange i % angripna blad, precis som bladfläckar..

Svartröst förekommer oftast på strået och ska noteras under Övriga skadegörare som procent angripna strån.

Havrerödsot. Graderas tre veckor efter axgång och anges som angripna plantor/m². Gradera endast plantor med symptom på något av de tre översta bladen. Gå en sträcka på 20 m mitt i bevakningsrutan. Räkna antalet plantor med symptom, en meter ut åt vardera hållet. Dividera antalet angripna plantor med 40 så får du antalet plantor med rödsotvirus per m².

I "**Övrigt**"-kolumnen noteras övriga skadegörare.

	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Primärangrepp	_____						
Mjöldagg			_____	_____	_____	_____	_____
Bladfläcksv.	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Bladlöss	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Fritfluga			—				
Kronrost				_____	_____	_____	_____
Svartröst						_____	_____
Rödsot							_____
Minerarflugestick		_____	_____				
Minerarflugeminor					_____	_____	