

Gradering av stråknäckare på våren

Fältnr: _____ Odlare _____ Gröda: _____

Provt.dat: _____ Utv.stad. _____ Sådatum _____

Ung. sådjup: _____ Graderare: _____ Datum: _____

Stråknäckare 0-3*				Stråknäckare 0-3*			
Planta nr	Huvudskott	Sidoskott 1	Sidoskott 2	Planta nr	Huvudskott	Sidoskott 1	Sidoskott 2
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

Anmärkningar:

- * 0 = Inget angrepp
- 1 = Svagt angrepp, endast på yttersta bladslidan
- 2 = Medelstarkt angrepp, på två bladslidor
- 3 = Starkt angrepp, på tre eller flera bladslidor

	Antal skott	% skott	Faktor	Index
Totalt				
Friska (0)			0	
Svagt ang. (1)			0,25	
Medel ang. (2)			0,5	
Starkt ang. (3)			1	

Summa skott: _____

Summa index: _____

Instruktion för gradering av stråknäckare på våren:

Symptom

Symptomen syns som 1–2 cm långa, chokladbruna fläckar, som på våren sitter på de nedersta bladslidorna. Ofta är fläckarna ganska diffusa, lite ljusare i centrum med en gråbrun – rödbrun bård. Ibland får vävnaden kring fläckarna en gulaktig ton.

Gradering

Ryck upp minst 40 plantor på fyra ställen i prognosrutan (4 x 10 plantor) i DC 31–32. Slå av jorden så gott det går. Om mycket jord sitter fast runt rötterna kan det vara bäst att skölja bort det försiktigt, se till att inte skölja bort de nedersta bladen samtidigt. Gradera huvudskottet och de sidoskott som förväntas bära ax (men max två sidoskott). Titta först på omslutande bladslidor (helt vissna blad räknas inte), om angrepp konstateras, skala bort yttre bladslidor för att se om angreppet trängt in till underliggande bladslidor och till slut ända till strået. Skriv kategori 0, 1, 2 eller 3 efter varje planta i protokollet, beroende på hur många bladslidor som angreppet trängt igenom.


Exempel:

Du har tittat på 40 huvudskott (inga sidoskott fanns). Av dem är 30 helt friska. 5 skott har angrepp på omslutande/första bladslidan. På 3 skott har svampen växt igenom första bladslidan och angreppet syns på underliggande bladslida. På 2 skott har svampen växt igenom även den andra bladslidan och är etablerad på underliggande bladslidor/strået.

	Antal skott	% skott	Faktor	Index
Totalt	40			
Friska (0)	30	$30/40 = 75\%$	0	$75 \times 0 = 0$
Svagt ang. (1)	5	$5/40 = 12,5\%$	0,25	$12,5 \times 0,25 = 3,12$
Medel ang. (2)	3	$3/40 = 7,5\%$	0,50	$7,5 \times 0,50 = 3,75$
Starkt ang. (3)	2	$2/40 = 5\%$	1,00	$5 \times 1,00 = 5$

Summa skott: 40

Summa index: 11,9



Växtskyddscentralen, Kungsängsvägen 19, 753 23 Uppsala

Vsc.uppsala@jordbruksverket.se, Fax: 018-12 34 10