

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 7 juni 2018

Här kommer andra instruktionen till er som graderar i Norrlandslänen. Vissa har redan börjat graderingarna så smått medan andra får vänta tills grödan kommit upp och nått rätt utvecklingsstadium. Vi har fått in rapporter om skador från minerarfluga så försök att hålla utkik efter denna både i stråsäd och vallgräs, en bild visas i slutet av dokumentet. Kom ihåg att använda nollor då ni rapporterar in en gradering av en skadegörare som inte syns till. Detsamma gäller för skadegörare ni hittar utöver de 50 blad ni graderar, dessa rapporteras då in som 0.01.

Rapportera in resultaten före kl.12.00 på tisdagar. Skicka gärna in blanketten med fältuppgifter (Fältkortet) om ni inte gjort det.

Graderingar aktuella fram till stråskjutning:

Utvecklingsstadium bestäms varje vecka!

Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per strå (ett strå = ett strå med vidhängande blad samt ax/vippa). Bladlössen kan sitta under jord vid torrt väder så dra försiktigt upp plantor och räkna där. Ange resultatet som antal per planta. Skriv gärna en kommentar om var eventuella löss satt.

Vårvete: Riskvärdering fritflugor. Gör riskvärdering för fritflugor i 1,5-bladsstadiet, DC 11. Mängden övervintrande fritflugor bedöms som måttlig. Samtliga graderingsplatser har överskridit 90 daggrader för mer två dagar sedan.

Havre: Primärangrepp av bladfläcksjuka, minerarfluga och riskvärdering av fritflugor. Gradering av primärangrepp görs enligt instruktion på baksidan av protokollet, se även under korn nedan. Riskvärderingen av fritflugor finns beskriven under vårvete. Minerarfluga graderas på 50 blad precis som bladfläckar.

Korn: Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räknas en gång när grödan är i stadium 13–21. Räkna friska respektive angripna plantor på 0,5 radmeter på fem platser i rutan. Angreppen hittas nästan alltid på det först uppkomna bladet men ibland på koleoptilen, det vill säga det hölje som skyddar första bladet. Ange procent smittade plantor under ”Prim.ang.”. Minerarfluga (se under Havre).

Våroljeväxter: Jordloppor. Graderingen görs på 25 plantor på fem olika ställen i den obesprutade rutan. På baksidan av graderingsprotokollet för våroljeväxter finns en mall för klassificeringen av skador.



Vågrandig jordloppa



Till vänster näringsstick från minerarfluga och till höger minor från minerarflugans larver.

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Jonas och Lukas

lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

jonas.torngren@jordbruksverket.se

070-949 60 74

lukas.hallberg@jordbruksverket.se

070-949 60 79