

Veckorapport – Alnarp vecka 17

Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter i Skåne, Halland och Blekinge. Svampangrepp avläses på de tre översta bladen.

Vädret under den gångna veckan har varit kyligt för årstiden. Utvecklingen i fälten har i det närmste stått still sedan föregående vecka.

Höstvete DC 24 (22-31) 78 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 17					Medel %	Medel %
	0 %	1-15 %	16-30 %	31-60 %	61-100 %	v. 16	v. 17
Mjöldagg	60	17	1	0	0	0,8	1,4
Svartpricksjuka	6	16	43	13	0	25,1	20,1
DTR (Vetets blfslj)	78	0	0	0	0	0,0	0,0
Brunrost	78	0	0	0	0	0,0	0,0
Gulrost	73	5	0	0	0	0,1	0,2

Mindre angrepp av gulrost har noterats främst i sorterna Norin och Kranich, men även i Julius, Praktik, Nord och Torp. Svartpricksjuka finns kvar i botten, men börjar så sakteligen växa ifrån.

Råg DC 32 (31-32) 14 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15 %	16-30 %	31-60 %	61-100 %	v. 16	v. 17
Mjöldagg	9	5	0	0	0	2,5	1,4
Sköldfläcksjuka	5	9	0	0	0	4,0	3,2
Brunrost	12	2	0	0	0	0,0	0,5

Små förekomster av brunrost har noterats i M Skåne och på Österlen (sorterna Marcelo och Brasetto).

Rågvete DC 31 (23-31) 12 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15 %	16-30 %	31-60 %	61-100 %	v. 16	v. 17
Mjöldagg	4	6	1	1	0	5,8	6,8
Bladfläcksvampar	9	3	0	0	0	1,2	1,0
Sköldfläcksjuka	12	0	0	0	0	0,0	0,0
Brunrost	12	0	0	0	0	0,0	0,0
Gulrost	7	3	1	1	0	3,0	6,5

Gulrosten har ökat i de fält där man förra veckan hittade gulrost. Gulrost har hittats runt om i Skåne och Halland, i flertalet sorter som t ex Seguenz, Empero, Remiko och Tulus.

Höstkorn DC 30 (24-31) 15 fält

	Antal fält efter angreppsgrad vecka 18					Medel %	Medel %
	0 %	1-15 %	16-30 %	31-60 %	61-100 %	v. 16	v. 17
Mjöldagg	8	3	4	0	0	8,6	7,4
Kornets bladfläcksjuka	13	2	0	0	0	0,8	0,5
Sköldfläcksjuka	7	8	0	0	0	1,8	2,1
Kornrost	12	3	0	0	0	1,0	1,7

Angreppen av kornrost har ökat något från föregående vecka, men förekomsterna är fortsatt låga. Fysiologiska fläckar (ofta mörkt bruna) förekommer i många av fälten, främst på de äldre bladen.

Höstraps DC 55 (55-59) 10 fält

Angrepp av ljus bladfläcksjuka förekommer i flera fält och har ökat något i vissa fält. Bladangrepp kan förväxlas med frost eller gödningskador. Det kyligare vädret gör att det nu inte är många rapsbaggar i rörelse, endast enstaka rapsbaggar noterades i prognosrutorna. Gulskålar är placerade i 7 fält. Endast några enstaka fyrtandade rapsvivar är hittills noterade.

Vårsäd (0-12)

Tidigt sådda fält uppkomna och senare sådder under uppkomst. Inget att rapportera.

Fritfluga Daggrader - temperatursummer 24 april

Helsingborg 9, Hörby 12, Kallinge 12, Malmö 11 och Torup 8.

Växtskyddscentralen Alnarp