

Hej!

Uppsala 30 april 2019

Dags att dra igång graderingarna!

För att inrapporteringen ska fungera via internet måste vi ha fått in fältkort för de fält som ni ska gradera. Vi är själva i fält under måndagar, så vi behöver få sådant på plats veckan innan.

Till er som har e-postadresser skickar vi instruktioner varje vecka den vägen och till er som vi inte använder e-post så skickar vi dem givetvis på papper.

Graderingar vecka 19, måndag 6 maj.

Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 7 maj. Sätt ut regnmätare!

Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.

Höstoljeväxter:

Rapsbagg graderas genom att räkna antalet baggar på 5 plantor i rad på 5 ställen i graderingsrutan (totalt 25 plantor) och ange som antal/planta. Enbart resultat från **obekämpade** fält rapporteras in.

Råg:

Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost.

Graderingsmetoden kan du läsa om under Höstveten nedan, eller på baksidan av graderingsprotokollet.

Rågvete:

Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost. Graderingsmetod kan du läsa om under Höstveten nedan, eller på baksidan av graderingsprotokollet. För rågvete skriver du alla bladfläckar i samma kolumn men skriv gärna en kommentar om vilken sjukdom som dominerar.

Höstkorn:

Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost.

Gradera de 3 översta bladen på 17 plantor plockade på 5 olika ställen i graderingsrutan tills du graderat 50 blad. Ange procent angripna blad. Gradera bara på gröna blad. Bladen måste vara fullt utvecklade innan de ska graderas, det vill säga att bladöronen och snärp är framme.

Höstvete:**Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost.**

Gradera de 3 översta bladen på 17 plantor plockade på 5 olika ställen i graderingsrutan tills du graderat 50 blad. Ange procent angripna blad totalt i **Bladfläckar**. I

Svartpricksjuka och **Bladfläcksjuka** anger du procent angripna blad av respektive sjukdom. Gradera bara på gröna blad. Bladen måste vara fullt utvecklade innan de ska graderas, det vill säga att bladörnen och snärp är framme. I vissa fält kan det innebära att man behöver titta på fler än 17 plantor för att få ihop 50 blad. **Stråknäckare** ska graderas när DC 31 uppnåtts, se foto. Det behövs 40 plantor för graderingen men det kan vara bra att gräva upp några extra. Metodbeskrivning och protokoll för graderingen bifogas. Om du inte vill gradera stråknäckare själv går det bra att lämna in plantorna till oss.

Våroljeväxter:

Jordloppor. Graderingen görs i DC 10–13 på 25 plantor vid fem olika stationer i den obesprutade rutan. På baksidan av graderingsprotokollet finns en mall för klassificeringen av skador. **Skriv en kommentar om bekämpning gjorts i fältet och/eller rutan.**

Ärter och åkerböna:

Randig ärtvivel. Gradera fem plantor på fem platser i rutan. Ange procent blad med gnag av vivel.



Axanlag

Vänliga hälsningar
Lina, Anders och Kristian

vsc.uppsala@jordbruksverket.se

lina.norrlund@jordbruksverket.se
072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se
070-662 18 85

kristian.barck@jordbruksverket.se
073-401 52 97