

Riskvärdering för angrepp av fritfluga i havre/vårvete

Växtskyddscentralen, Kungsängsg. 19, 753 23 Uppsala

Vsc.uppsala@jordbruksverket.se, Fax: 018-12 34 10

Fältnummer:..... Namn:.....

Datum:..... Utvecklingsstadium:.....

Riskvärderingen ska ske när grödan är i **1,5-blad stadium**. Bedömning av mängden övervintrandeflugor publiceras i växtskyddsbrev.

Risikfaktor		Risikpoäng
Tidpunkt då 1,5 blad uppnås	mer än 2 dagar <i>efter</i> datum för 90 D°	30
	vid datum för 90 D° ± 2 dagar	20
	mer än 2 dagar <i>innan</i> datum för 90 D°	0
Väderleksprognos för veckan efter 1,5 blad	varmt - daglig maxtemp över 17 °C	20
	svalt - daglig maxtemp 15-17 °C	15
	kallt - daglig maxtemp under 15 °C	0
Bedömning av mängden övervintrande fritflugor	stor	20
	måttlig	10
	liten	0
Fältstorlek	1 - 2 ha	15
	3 - 5 ha	5
	mer än 5 ha	0
Jordart	mulljord	5
	fastmarksjord	0

Summa riskpoäng:

Risikbedömning

Område	Risikpoäng	Risik för angrepp över skadetröskeln
Risikområden (främst Götalands skogsbygder)	0 - 45	Liten (ca 5 %)
	50 - 60	Måttlig (ca 10 %)
	65 - 90	Stor (ca 70 %)
Övriga områden (slättbygder)	0 - 45	Liten (ca 1 %)
	50 - 70	Måttlig (ca 10 %)
	75 - 90	Stor (ca 40 %)

Vid måttlig risik för angrepp

är det svårt att bedöma behovet av bekämpning. Man bör ta hänsyn till egna erfarenheter av tidigare års angrepp på gården. Se aktuellt växtskyddsbrev.

Preparat och tidpunkt för bekämpning

Se Bekämpningsrekommendationer – svampar och insekter.