

Veckorapport – Västra Götalands län vecka 36, 2017

Gulskålsfångster i höstraps

I Skaraborg har 11 gulskålar placerats ut i höstrapsfält som vi tömmer varje vecka.

Inflygningen av **rapsjordloppa** pågår och fångstskålar är utplacerade för att följa förekomsten och värdera behovet för bekämpning riktad mot rapsjordloppans larver. Skålfångsterna är fortsatt låga med undantag för ett fält som nu är bekämpat. Fångstskålarna kan inte användas för att belysa gnagskadorna som orsakas av den vuxna rapsjordloppan, utan där måste en gradering av bortgnagd bladyta ske i det enskilda fältet. Vi hittar gnagskador av rapsjordloppa men i liten omfattning. Gnagskador av rapsjordloppa kan lätt förväxlas med kålbladstekel. Se bilder i [växtskyddsbrev nr 19](#).

Riktvärde gnagskador: cirka 10 % uppäten bladyta, fram till 2-4 örtblad är utvecklade.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Antalet vuxna **kålbladsteklar** som fångats i gulskålarna har minskat på alla platser och inga larver har påträffats i fälten. Det regniga och svalare vädret gynnar inte kålbladstekeln.

Bekämpningströskel kålbladstekel är bekämpningströskeln 1 larv per planta.

Tabell 1. Skålfångster i Skaraborg 2017

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål				Ackumulerad fångst / 10 dm ²
		Antal rapsjordloppor / 10 dm ² och dygn				
		21/8	28/8	4/9		
Grästorp	12	0	0	0,0		0,0
St Leverne	12	0	0,2	0,0		1,3
Lidköping	13	0,2	0	0,6		5,3
Lundsbrunn	13	0	0,6	0,9		10,5
Skövde 1	13	0	0	0,0		0,0
Skövde 2	13	0	0,4	0,2		3,9
Vara	12	0	0,2	0,0		1,3
Hjo	14	0	0,6	0,6		7,9
Ardala	10-12	0,2	0,2	1,5		13,2
Vinninga	13	1,5	9	8,6		132,9*
Tolsjö	11-12	0	0	0,6		3,9

*Fältet är behandlat. Ackumulerad fångst börjar om från noll nästa vecka.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden