

## Veckorapport – Alnarp vecka 38 nr 2 - rapsjordloppa

### Rapsjordloppa - Skålfångster - hösten 2017

Inflygningen av rapsjordloppa pågår fortfarande och totalt är nu sju fält över bekämpningströskeln. Fångstskålarna är utplacerade i obehandlade rutor för att följa förekomsten och värdera behovet för bekämpning riktad mot **rapsjordloppans larver**.


**Bekämpningströskel (för larvskador):** 50-100 rapsjordloppor/10 dm<sup>2</sup> i ackumulerad fångst. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde. Riktvärde för **gnagskador** av rapsjordloppa är: mer än 10 % uppäten bladyta. Observera att gnagskador även förekommer i fält där det inte förekommit så många jordloppor i gulskålarna.

**Det fortsatt regniga vädret gynnar sniglarna, bevaka fälten noggrant, detta gäller även plöjda fält.** Även kålbladmögel gynnas av det regniga vädret och ses på många platser men brukar endast orsaka måttlig skada.

Rapporter har kommit in om att **larver av kålbladstekel** har observerats i några fält i Blekinge. Angreppen har hittills inte varit så allvarliga i vår del av landet, men håll utkik.

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål, antal rapsjordloppor / 10dm <sup>2</sup> och dygn										Ackumulerad fångst /10dm <sup>2</sup>
		28/8	31/8	4/9	7/9	11/9	14/9	18/9	21/9			
<b>Nordvästra Skåne</b>												
Viken	14	0,4	4,8	5,6	4,6	0,0	1,8	4,6	0,9			84
Kattarp	14	0,0	4,8	0,7	1,3	0,9	11,4	11,8	10,5			138
Åstorp	15	2,0	17,1	3,6	10,2	0,9	3,5	10,5	3,9			186
Häljarp	11	-	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0				4
<b>Lund/Mellanskåne</b>												
Löberöd	12	0,4	1,8	1,0	0,9	0,0	0,4	1,6	1,8			26
Fjellie	12	0,0	0,9	0,3	0,3	0,0	0,9	0,0	0,9			11
Lund	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,4	0,0			1
Genarp	13	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,6			17
Kyrkheddinge	14	0,9	0,4	0,3	-	0,2	0,4	3,9	0,4			24
<b>Sydvästra Skåne</b>												
Gessie	16	0,0	1,8	2,0	3,1	2,3	1,3	0,0	2,6			43
Håslöv	14	-	4,8	2,0	1,8	6,6	8,3	6,9	6,1			125
Alstad	15	0,3	11,4	3,0	6,1	4,3	3,5	1,0	1,3			101
Hemmesdynge	14	6,4	26,8	29,3	15,4	6,6	10,5	8,6	8,3			399
Jordberga	14	0,0	1,3	1,3	1,8	1,3	0,0	0,0	0,9			22
Skivarp	16	0,3	0,0	2,0	1,3	2,6	2,6	3,3	5,7			62
<b>Sydöstra Skåne</b>												
Sandby Gård	10	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9			4
Gärnsnäs	13	-	-	0,8	1,8	2,0	0,4	1,0	3,9			36
Tomelilla	13	0,2	-	0,6	2,2	1,3	1,3	0,3	3,1			32
<b>Nordöstra Skåne</b>												
Kristianstad	13	0,9	-	2,1	0,9	1,3	1,8	1,0	1,8			39
<b>Blekinge</b>												
Bräkne-Hoby	14	-	-	0,6	1,3	0,3	0,4	0,0	0,4			12

Utvecklingsstadier: 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.



**Figur 1.** Fångster av rapsjordloppa i Skåne och Blekinge 2008, 2013-2017. Ackumulerad fångst veckovis.

/Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden