

Veckorapport v 35 (2) - Rapsjordloppa

2016-09-02

Inflygningen av rapsjordloppa pågår och fångstskålar är utplacerade för att följa förekomsten och värdera behovet för bekämpning riktad mot **rapsjordloppans larver**. I flertalet av fälten har förekomsten av rapsjordloppa ökat sedan förra avläsningen och två av fälten har passerat tröskelvärdet. Fångstskålarna kan inte användas för att belysa gnagskadorna som orsakas av den vuxna rapsjordloppan, utan där måste en gradering av bortnagd bladyta ske i det enskilda fältet. Riktvärde gnagskador: ca 10 % uppäten bladyta, fram till 2-4 örtblad är utvecklade. Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärdet.

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål Antal rapsjordloppor / 10 dm ² och dygn		Ackumulerad fångst / 10 dm ²
		29/8	2/9	
Nordvästra Skåne				
Viken	14	2,4	16,2	66
Kattarp	12	1,1	5,7	25
Åstorp	13	2,4	12,3	54
Häljarp	11	0,0	3,1	9
Lund / Mellanskåne				
Löberöd	11	2,1	0,4	16
Furulund	12	1,9	5,7	30
Lund	11	0,7	1,3	5
Genarp	10	0,0	0,0	0
Kyrkheddinge	11	0,0	3,1	9
Sydvästra Skåne				
Staffanstorps	12	0,8	0,4	5
Gessie	10	0,2	0,4	3
Bodarp	12	5,3	1,3	36
Maglarp	11	1,5	0,9	12
Hemmesdynge	10	3,7	4,4	36
Skivarp	10	0,0	0,4	1
Sydöstra Skåne				
Charlottenlund	11	0,2	4,8	16
Sandby Gård	10	0,4	3,1	12
Gärnsås	11	0,8	6,6	25
Tomelilla	10	0,6	4,8	18
Nordöstra Skåne				
Kristianstad	10	0,0	0,9	3
Blekinge				
Bräkne-Hoby	11	0,2	0,4	3

Utvecklingsstadier: 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.

Växtskyddscentralen Alnarp



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden