

Veckorapport – Västra Götalands län vecka 41, 2017

Rapsjordloppa

De gulskålar vi har haft utplacerade i 10 höstrapsfält i Skaraborg har nu plockats in. Skålarna har tömts en gång i veckan används framför allt för att följa rapsjordloppans inflygning.

Vi fångar fortfarande **rapsjordloppa** men trenden pekar neråt. Antalet vuxna rapsjordloppor som fångas värderar behovet av bekämpning riktad mot rapsjordloppans larver. De ackumulerade skålfångsterna har ökat men det finns inga fler fält (utöver det som tidigare har bekämpats) där antalet når upp till bekämpningströskeln, se tabell 1.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Tabell 1. Skålfångster i Skaraborg 2017

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål				Ackumulerad fångst /10 dm ² (3 veckor)
		Antal rapsjordloppor /10 dm ² och dygn				
		18/9	25/9	2/10	9/10	
Grästorp	17	0	0,9	0,2	0,2	9,2
St Levene	16	0,6	1,3	0,9	0,8	21,1
Lidköping	17	2,1	2,4	2,6	0,8	43,4
Lundsbrunn	17	2,3	1,9	1,7	1,6	39,5
Skövde 1	17	0,9	1,5	0,9	0,9	22,4
Skövde 2	17	1,9	1,3	2,6	0,9	32,9
Vara	16	0,2	0,9	0,4	1,7	21,1
Ardala	15	2,4	2,1	5,1	1,3	63,2
Vinninga	17	4,3	1,7	1,7	0,1	25,0
Tolsjö	17	0,6	0,9	0,8	0	11,8

*Fältet är behandlat. Ackumulerad fångst återställdes för två veckor sen.

Fångster av stritar i höstvetefält

Växtskyddscentralen har fångstskålar utplacerade på flera platser för att följa förekomsten av den randiga dvärgstriten som kan bära på viruset som orsakar vetedvärgsjuka. Randiga dvärgstritar som fångas analyseras för virus på SLU Ultuna senare i höst. Först i vår kommer vi veta om det förekommer mycket virus i utsatta områden.

Hittills har ett trettiotal stritar fångats i norra Skaraborg i området mellan Vara och Skara har ett tiotal stritar fångats. Enstaka stritar har fångats i området mellan Vara och Skara i veckan som passerat.

Bekämpningströskel saknas. Allmänt bedöms risken som låg i år på grund av sen höstsådd. Bekämpning mot randig dvärgstrit som kan bära på viruset kan övervägas i oplöjda fält som är tidigt sådda och ligger i områden där vetedvärgsjuka har förekommit historiskt.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden