

## Veckorapport – Västra Götalands län vecka 40, 2017

### Rapsjordloppa

I Skaraborg finns sedan flera veckor gulsålar utplacerade i 10 höstrapsfält. Skålarna som töms en gång i veckan används framför allt för att följa rapsjordloppans inflygning.

Fortsatta fångster av **rapsjordloppa** visar att det fortfarande finns en aktivitet i rapsfälten. Antalet vuxna rapsjordloppor som fångas värderar behovet av bekämpning riktad mot rapsjordloppans larver. De ackumulerade skålfångsterna har ökat och ett till fält utöver det som tidigare har bekämpats har nått upp till bekämpningströskeln, se tabell 1. Med det kallare och blöta vädret som spås framöver är bekämpningsbehovet mindre.

**Bekämpningströskel larvskador:** 50-100 rapsjordloppor/10 dm<sup>2</sup> i ackumulerad fångst under tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Tabell 1. Skålfångster i Skaraborg 2017

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål				Ackumulerad fångst /10 dm <sup>2</sup> (3 veckor)
		Antal rapsjordloppor /10 dm <sup>2</sup> och dygn				
		11/9	18/9	25/9	2/10	
Grästorp	17	0	0	0,9	0,2	7,9
St Levene	15	0,6	0,6	1,3	0,9	19,7
Lidköping	16	0,8	2,1	2,4	2,6	50,0
Lundsbrunn	16	0,9	2,3	1,9	1,7	40,8
Skövde 1	17	1,1	0,9	1,5	0,9	23,7
Skövde 2	17	0,9	1,9	1,3	2,6	40,8
Vara	16	0,6	0,2	0,9	0,4	14,5
Ardala	14	1,7	2,4	2,1	5,1	67,1
Vinninga	16	2,8	4,3	1,7	1,7	11,9*
Tolsjö	16	1,1	0,6	0,9	0,8	15,8

\*Fältet är behandlat. Ackumulerad fångst återställdes förra veckan.

### Fångster av stritar i höstvetefält

Växtskyddscentralen har fångstskålar utplacerade på flera platser för att följa förekomsten av den randiga dvärgstriten som kan bära på viruset som orsakar vetedvärgsjuka. Randiga dvärgstritar som fångas analyseras för virus på SLU Ultuna senare i höst. Först i vår kommer vi veta om det förekommer mycket virus i utsatta områden.

Hittills har ett trettiotal stritar fångats i norra Skaraborg och mängden fångade stritar har minskat sedan föregående vecka. I området mellan Vara och Skara har ett tiotal stritar fångats och där är det något fler fångade från föregående vecka.

Bekämpningströskel saknas. Allmänt bedöms risken som låg i år på grund av sen höstsådd. Bekämpning mot randig dvärgstrit som kan bära på viruset kan övervägas i oplöjda fält som är tidigt sådda och ligger i områden där vetedvärgsjuka har förekommit historiskt.



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden