

Vårsäd i Östergötland

Erfarenheter 2012

Viktiga punkter för bra skörd av vårsäd:

- Grödval kopplat till jordart/markstruktur
- Sortval
- Radavstånd, ogräsreglering, såtidpunkt
- Gödsling

Per Ståhl

Hushållningssällskapet Vreta Kloster

Erfarenheter 2012 Östergötland

Tidig (mars/april) och sen (april/maj) sådd:

- Tidig sådd gav kraftigt ogräsutslag men grödan klarade i de flesta fall av det – bra konkurrens. Hög skörd! Klarade regnen bra.
- Senare sådd; hantera gröna fält, dålig skörd på styv jord med dålig dränering, tog mer stryk av lössen.
- Kall vår med sena kväveeffekter trots bra fukt.

Flera fall med mycket skräppa; varför grodde så mkt hösten 2011?

Helträda 2012 – flera som använde men lite svårt med timing i nederbördsrik säsong

Grödval kopplat till jordart/markstruktur

- Vårmete ska ha bra förfrukt. Bättre än korn vid mycket vatten.
- Havre avkastar bra på styv jord. Klarar sig bäst vid mycket vatten
- Korn måste ha bra markstruktur, ej dålig dränering och styv jord.



Sortval

Vårvete: Inte mycket att välja på. Dacke nummer ett. Bra proteinhalt viktigt. Hur går det med gulrosten framöver?? Andra sorter till foder?

Havre: Kerstin, Belinda, Ivory fungerar bra. Relativt små skillnader.

Korn: Anakin, Luhkas, Justina, Mercada – på bra kornjordar. Jyvhä – tidigt korn som är intressant vid höga ogrästryck, har en snabb tidig tillväxt. Tidig mognad (höstraps efter).



Jyvhä 6 juli Bråborg

Radavstånd, ogräsreglering, såtidpunkt

Vallgårdar där det ofta är vårsäd med insådd:

- Insådden är viktigast. Så in direkt efter skyddsgrödan (senast vid uppkomst) med vanligt radavstånd.

Växtodlingsgårdar med högt ogrästryck:

- Så med 25 cm radavstånd och hacka. Ger örtogräsfria fält. Bra mot rotogräs.
- Mylla gödsel helst före sådd. Efter sådd så fort man ser raderna.
- Vallfrö går bra att så mellan raderna och i samma rad (inte alla arter).

Kvickrot mm:

- Genomskärning före sådd.
- Hacka efter kvickrotens stadier.



Gödsling

Tidig tillgång på kväve är mycket viktigt på lerjord!

- Kombisådd pellets har varit ett lyft.
- Biogödsel, flytgödsel före sådd nerharvat – bra kväveeffekt.

Vinass ska myllas eller spädas ut före spridning (1-3 ggr) med tunna. Tidig spridning viktigt.

Biogödsel efter uppkomst ska myllas på något sätt om det inte är regn direkt efter.



Kombieffekt pellets