

Rådgivningsenheten Norr  
Växtskyddscentralen

**Hej!**

**Uppsala 28 juni 2018**

Den senaste veckan har det observerats en ökning av löss i vårsåden, över hälften av de graderade prognosrutorna med vårkorn har nu överskridit bekämpningströskeln. Eftersom mängden löss rapporteras som **antal per strå** så ska du inte räkna med löss som uppenbart sitter på sidoskott.

Kom ihåg att vid bekämpning inte utföra denna i graderingsrutor, varken med fungicider eller insekticider. Även om det skulle inträffa är det viktigt att ni meddelar det till oss och inte graderar det som bekämpats efteråt. De siffror som läggs in i databasen ska enbart komma från obehandlade rutor.

## **Aktuella graderingar vecka 28:**

**Utvecklingsstadium bestäms varje vecka!** Rapportera in resultaten före kl.12.00 på tisdagar.

**Bladlöss graderas i all stråsäd.** Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per strå (ett strå = ett strå med vidhängande blad samt ax/vippa). Bladlössen kan sitta under jord vid torrt väder så dra försiktigt upp plantor och räkna där. Ange resultatet som antal per planta. Skriv gärna en kommentar om var eventuella löss satt.

**Korn: Primärangrepp av bladfläcksjuka.** Räknas **en** gång när grödan är i stadium 13–21. Räkna friska respektive angripna plantor på 0,5 radmeter på fem platser i rutan. Angreppen hittas nästan alltid på det först uppkomna bladet men ibland på koleoptilen, det hölje som skyddar första bladet. Ange % smittade plantor under ”Primärangrepp”.

**Mjöldagg, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka.** Graderas från DC 30. Ange % angripna blad. Bladen måste vara fullt utvecklade innan de graderas, bladöron och snärp ska synas.

**Minerarfluga.** Gradera symptom på 50 blad precis som bladfläckar, ange %.

- Under stråskjutning (fram till DC 37): **Näringsstick**
- Under axgång (från DC 49, borsten synliga): **Minor**

**Havre: Primärangrepp av bladfläcksjuka** (se under Korn). **Mjöldagg, bladfläckar, rost.** (se under Korn). **Riskvärdering av fritfluga.** Gör riskvärdering för fritfluga i 1,5-bladsstadiet, DC 11. Mängden övervintrande fritflugor bedöms som måttlig. Samtliga graderingsplatser har överskridit 90 daggrader för mer än två veckor sedan. **Minerarfluga** (se under korn)

**Vårvete: Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Riskvärdering fritfluga.**  
(se under Havre).

**Våroljeväxter: Rapsbaggar.** Avräknas från DC 15. Räkna av fem plantor på fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta. **Kålmal.** Skriv en kommentar om flygande kålmal eller dess larver hittas i fält. **Kålbladstekel.** Kommentera även om kålbladstekellarver påträffas.



*Angrepp av kornets sköldfläcksjuka.*

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Jonas och Lukas

[lina.norrlund@jordbruksverket.se](mailto:lina.norrlund@jordbruksverket.se)

072-222 68 23

[anders.lindgren@jordbruksverket.se](mailto:anders.lindgren@jordbruksverket.se)

070-662 18 85

[jonas.torngren@jordbruksverket.se](mailto:jonas.torngren@jordbruksverket.se)

070-949 60 74

[lukas.hallberg@jordbruksverket.se](mailto:lukas.hallberg@jordbruksverket.se)

070-949 60 79