

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 11 juli 2018

Det växer så att det knakar och på sina håll kommer kornet snart gå in i mjölmognad. Utvecklingen mellan axgång och mjölmognad går fort och kan vara svår att bedöma. Titta gärna en extra gång på bilden på andra sidan och skala och kläm på kärnan när du ska bestämma utvecklingsstadie.

Samma graderingsinstruktioner gäller även för denna vecka men fortsatt håll utkik efter bladfläckar och notera vilken typ av bladfläck det är. Fysiologiska fläckar ska inte summeras i resultaten men notera gärna förekomst under anteckningar.

Aktuella graderingar vecka 29:

Utvecklingsstadium bestäms varje vecka, tänk på att alltid leta efter nästa utvecklingsstadium. Det är alltid det högsta som gäller! De kommande veckorna är det inte nödvändigt att rapportera in graderingar till tisdag kl. 12.

Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per strå (ett strå = ett strå med vidhängande blad samt ax/vippa). Bladlössen kan sitta under jord vid torrt väder så dra försiktigt upp plantor och räkna där. Ange resultatet som antal per planta. Skriv gärna en kommentar om var eventuella löss satt.

Korn: Mjöldagg, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka.

Rödsot (samma som gulsot) (se bild). Graderas en gång i mjölmognad (DC 73-77). Anges som angripna plantor/m². Gradera endast plantor med symptom på de tre översta bladen. Gå en sträcka på 20 m mitt i graderingsrutan. Räkna antalet plantor med symptom, en meter ut åt vardera håll. Dividera antalet angripna plantor med 40 så får du antalet plantor med gulsotvirus per m².

Flygsot. Räkna antalet angripna plantor längs 1x10 m på 5 ställen i rutan, graderas en gång. Räkna ut antalet angripna plantor per m² och notera i anteckningsrutan.

Minor av minerarflugor graderas **en gång** från DC 49 (borsten synliga) på 50 blad precis som bladfläckar.

Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost. Rödsot (se under korn). **Flygsot.** (se under korn). **Minor av minerarflugor** (se under korn)

Våroljeväxter: Rapsbagg. Avräknas från DC 15. Räkna av fem plantor på fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta. **Kålmal.**

Skriv en kommentar om flygande kålmal eller dess larver hittas i fält.
Kålbladstekel. Kommentera även om kålbladstekellarver påträffas.



Rödsotvirus i korn.



Mjölmognad, stråsäd.

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Jonas och Lukas

lina.norrlund@jordbruksverket.se
anders.lindgren@jordbruksverket.se
jonas.torngren@jordbruksverket.se
lukas.hallberg@jordbruksverket.se

072-222 68 23
070-662 18 85
070-949 60 74
070-949 60 79