

## 18 Livsmedelssäkerhet

*Livsmedelssäkerhet är ett begrepp som får allt större uppmärksamhet. Alla delar i livsmedelskedjan har betydelse för livsmedelssäkerheten och helhetsperspektivet "från jord till bord" är viktigt. I detta kapitel redovisas uppgifter om vattenkvalitet, bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och animalier samt exempel på hur man kan visa förekomsten av bakterier (Campylobacter och Salmonella) i olika led av livsmedelskedjan, från djurfoder till antal rapporterade humana sjukdomsfall.*

### Sammanfattning

#### Allmänt

EU-kommissionen lägger stor vikt vid att konsumenterna ska tillförsäkras livsmedel av hög säkerhet och framhåller termen "från jord till bord" som inkluderar hela livsmedelskedjan från primärproduktionen på gården till livsmedelsbutiken. Målsättningen är att garantera konsumenterna livsmedel av hög säkerhet och kvalitet.

Begreppet säkra livsmedel kan definieras med att "livsmedlen inte ska utsätta konsumenten för någon hälsorisk varken på lång eller kort sikt". Hälsorisken kan orsakas av att livsmedlet innehåller, ur riskvärderingssynpunkt, höga halter av icke önskvärda substanser och organismer. Med den definitionen är det i Sverige flera myndigheter som delar på ansvaret att sörja för livsmedlens säkerhet beroende på att olika myndigheter ansvarar för olika delar av produktionskedjan.

#### Tillgång på statistik

Den statistik som finns om livsmedelssäkerhet har främst tonvikt på icke önskvärda ämnen i livsmedel. Statistiken på området produceras i huvudsak av Livsmedelsverket. Uppgifterna har dock inte karaktär av reguljär statistik och följer inte fortlöpande utvecklingen av kvaliteten hos t.ex. livsmedel eller det hygieniska tillståndet i livsmedelsbutiker och restauranger.

### Undersökningsresultat

#### Dricksvatten

Livsmedelsverket har sedan början av 1990-talet begärt in uppgifter om livsmedels- och dricksvattenkontrollen från landets kontrollmyndigheter. När en eller flera kommuner går ihop och har en gemensam organisation för kontrollen, så är det myndigheten och inte de enskilda kommunerna som rapporterar in sina resultat. Enligt Livsmedelsverkets sammanställning för år 2013 rapporterade 252 kontrollmyndigheter resultat från totalt 4 115 dricksvattenanläggningar.

Följande finns i Livsmedelsverkets rapport 14/2014, *Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2013*:

Inrapporterade dricksvattenanläggningar 2013 uppdelade efter typ av råvatten eller enbart distributionsanläggning:

Typ av anläggning	Antal	Andel, %
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten	2 888	70
Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten	486	12
Vattenverk som försörjs av ytvatten	283	7
Enbart distributionsanläggning	294	7
Uppgift saknas	164	4
<b>Totalt</b>	<b>4 115</b>	<b>100</b>

Under 2013 utfördes 1 514 kontroller på dricksvattenanläggningar. Kontrollresultaten redovisas i form av 15 rapporteringspunkter, varav vattenkvalitet är ett kontrollområde. Andelen kontroller utan avvikelser för kontrollområdet vattenkvalitet var 63 % för år 2013.

Under 2012 och 2013 rapporterade kontrollmyndigheterna inga dricksvattenburna sjukdomsutbrott till Livsmedelsverket.

År 2009 rapporterades resultat från totalt 4 415 anläggningar. Totalt rapporterades drygt 39 500 mikrobiologiska och drygt 29 400 kemiska prov. De mikrobiologiska var lika många som året innan, medan de kemiska var 650 färre. Under året rapporterade 47 % av kontrollmyndigheterna anläggningar med anmärkningar på dricksvattnet. Av alla dricksvattenanläggningar hade 8 % någon typ av anmärkning 2009. Av **figur 18A** och **tabell 18.1** framgår att den mest förekommande typen av anmärkning var kemiska problem av estetisk/teknisk karaktär (40 %), därefter kom mikrobiologiska anmärkningar av hälsomässig karaktär (39 %) följt av anmärkningar om hälsomässiga/ kemiska problem (22 %). Enligt **figur 18B** förekommer anmärkningar av mikrobiologisk hälsomässig karaktär och kemiska problem av estetisk/teknisk karaktär i större utsträckning på de större anläggningarna än på de mindre.

Under 2009 rapporterades fem dricksvattenburna sjukdomsutbrott.

### Bekämpningsmedelsrester

I Livsmedelsverkets kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung uttogs 1 836 prover under 2013. Av dessa överskred 18 (1 %) under 2013 gällande gränsvärden. Majoriteten av proverna togs på färska och frusna frukter och grönsaker (**tabell 18.2**).

I **figur 18C** sammanfattas resultaten av genomförda provtagningar under 2013. Diagrammet visar att det i första hand är bananer (konventionellt odlade), bordsdruvor, citrusfrukter, samt äpplen som konstaterades innehålla bekämpningsmedelsrester. För bl.a juicer och fruktdrycker, ekologiska bananer, tomater samt sallat fanns inga prov med överskridna gränsvärden. Överskridna gränsvärden noterades främst för citrusfrukter.

**Figur 18D** visar att andelen överskridanden av gränsvärden för tillåtna bekämpningsmedelsrester i färska frukter och grönsaker

sedan mitten av 1990-talet har genomgående varit betydligt högre i importerade produkter än i inhemska. Trenden visar på att andelen prov av frukter och grönsaker med halter av bekämpningsmedel över gränsvärden har sjunkit för tredje land sedan 2012.

I provtagningen för frukt och grönsaker kom 84 % av proverna från importerade varor och 100 % av överskridanden fanns bland dessa under 2013 (**tabell 18.3**).

Resthalter under gränsvärdet har ökat sedan föregående år (**figur 18E**). Fram till 2007 ökade andelen sådana prov och två orsaker kan antas ha bidragit till denna trend. Den första är att provtagningen varierar år från år. Den andra är att analysmetoderna förbättras, att man över tiden letar efter fler substanser och man förmår detektera dem i allt lägre halter. Den ökande andelen prov under gränsvärdet behöver därför inte tyda på att förekomsten av bekämpningsmedelsrester i våra livsmedel ökar utan kan bero på att man har blivit bättre på att hitta dem. Andelen prov med resthalter under gränsvärdet är något högre än 2007.

I tidigare årsrapporter har Livsmedelsverket presenterat resultat från inhemsk odlad frukt och grönsaker på certifierad odling och konventionell odling. Vid osäkerhet vid provtagning registreras provet som icke certifierad odling, vilket innebär att uppgifterna i Livsmedelsverkets databas förmodligen inte är helt korrekta vad gäller de olika odlingsformerna för svensk frukt och svenska grönsaker.

Om ett stickprov innehåller resthalter av bekämpningsmedel över ett gränsvärde kan Livsmedelsverket besluta om villkor för hantering eller saluhållande av varan från odlaren/leverantören. Vid den uppföljande provtagningen, ofta benämnd riktad provtagning, kvarhålls partiet i avvaktan på resultatet av undersökningen. Enbart partier som uppfyller bestämmelserna får därefter saluföras.

Under 2013 utfärdade Livsmedelsverket sammanlagt sju villkor för saluhållande och saluförbud lades för ett parti äpplen på 17 ton från Brasilien. Under 2013 skickade Sverige två RASFF-anmälningar till Europeiska

kommissionen för att underrätta dem och övriga medlemsländer att det påträffats frukter och grönsaker med halter som både överskred gränsvärdet och den akuta referensdosen. RASFF är ett snabbt varningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet. Systemet är ett särskilt förfarande för kontrollmyndigheterna för att informera varandra om livsmedel på marknaden vari hälsofaror påträffas. Information sprids via Europeiska kommissionen till ett nätverk av kontrollmyndigheter inom EU.

### Campylobacter

Under 2013 undersöktes 3 046 svenska fjäderfäflokar för förekomst av *Campylobacter* i samband med slakt och av dessa var 267 (9 %) positiva (tabell 18.4). I figur 18F kan man se att andelen positiva prov för *Campylobacter* tagna på slaktkycklingar var relativt stabil åren 2008–2009, men ökade år 2010 till drygt 13 %. År 2012–2013 har andelen dock minskat.

Under 2013 rapporterades totalt 8 114 fall av human *Campylobacter*smitta. Av dessa hade 41 % ådragit sig smittan i Sverige (figur 18G). Det totala antalet rapporterade fall av smitta har ökat med 3 % sedan 2012 och andelen som har smittats i Sverige visar en ökning med 4 % sedan 2012.

### Salmonella

Vid provtagning på gårdar (figur 18H) upptäcktes *Salmonella* i 15 nötbosättningar och 8 fjäderfäflokar (slaktkyckling, kalkon och värphöns) år 2013.

Provtagningar vid slakteri, styckningsanläggningar och provtagning i kommuner visar samma nivå då mycket få fynd av *Salmonella* påträffas. *Salmonella* påvisades inte alls från de 4 823 officiella prover av nötkött och svinkött tagna på styckningsanläggningar under 2013. Inte heller från de 927 proverna av fjäderfäkött påvisades *Salmonella*. Från landets kommuner rapporterades det in 1 186 analyser i handeln, varav 0,4 % var positiva. År 2005 var 4 % av alla kycklingprover rapporterade från kommuner positiva avseende *Salmonella* (tabell 18.5).

Under 2013 rapporterades totalt 2 838 humanfall av *Salmonella* i Sverige. Av dessa hade 23 % fått smittan i Sverige (figur 18I). De vanligaste misstänkta smittkällorna är mat och vatten, personkontakter och djur.

## Om statistiken

### Dricksvatten

Landets producenter av dricksvatten har ansvaret att tillhandahålla en produkt av hög kvalitet och för att uppnå detta sker regelbundna kontroller i enlighet med Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift. Kvalitetskontroller görs dels i egenkontrollprogram dels av kommunens tillsynsmyndighet. Resultaten rapporteras sedan till Livsmedelsverket som sammanställer data för hela landet. Den 25 december 2003 trädde nya dricksvattenföreskrifter i kraft vilket medför svårigheter att göra jämförelser bakåt i tiden på vissa parametrar.

### Bekämpningsmedelsrester

Livsmedelsverket har ett löpande kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. I vilken mängd varje varugrupp och enskild vara ska undersökas bestäms med hänsyn tagen bl.a. till konsumtionsmängd, om produkten äts med eller utan skal och kännedom från tidigare år om höga halter. Analyserna förmår detektera 465 pesticider (aktiva substanser).

I det nationella programmet ingår EU:s koordinerade program som år 2013 omfattar äpplen, persika/nectarin, viner, jordgubbar, tomater, huvudkål, sallat, purjolök, råg/havre, svinkött, komjölk samt färdig barnmat. Dessa produkter analyserades i samtliga medlemsländer på förekomst av 191 respektive 65 ämnen för bekämpningsmedel i produkter av vegetabilisk resp. animalisk ursprung.

Resultatredovisningen har anpassats till de av EU fastställda tillåtna högsta gränsvärdena för olika pesticider (Maximum Residue Limits, EC-MRLs).

## Campylobacter

Undersökningar över förekomst av *Campylobacter* i slaktkycklingflockar har pågått sedan 1991. Programmet har ändrats 2001 och 2005. För *Campylobacter* i livsmedel finns inget officiellt kontrollprogram utan information samlas in via olika projekt som Livsmedelsverket driver tillsammans med kommuner och andra parter. *Campylobacter*smitta är den vanligaste orsaken till inhemsk mag-/tarmsjukdom och de vanligaste smittvägarna antas vara livsmedel och vatten.

## Salmonella

Sedan 1961 finns kontrollprogram för att förhindra spridning samt övervaka förekomsten av *Salmonella* i Sverige. Kontrollprogrammet övervakas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Programmen kontrollerar hela livsmedelskedjan från djurfoder till slakteri (och styckning).

I foderproduktionen sker provtagningen enligt speciella regler och frekvenser beroende på vad för djurslag fodret är ämnat för. Utöver obligatoriska prover tas ofta frivilliga prover.

I ägg- och köttproducerande fjäderfäbesättningar tas prover en gång per år av veterinärer, annars av djurägarna. Skulle man upptäcka smitta spärras gården av och restriktioner införs för att hindra smittospridning. Är det en fjäderfäflock som drabbats avlivs dessutom hela flocken och gården spärras och desinficeras. För samtliga djurslag undersöks fodret som ett led i att spåra smittokällan.

Provtagning sker även på slakterier och styckningsanläggningar där provtagningens omfattning beror på slakteriets kapacitet och utförs av en besiktningsveterinär. På slakterier tas dels prover på lymfknotor som visar om djuret bär på en infektion, dels svabbprover på slaktkroppar som vid fynd av *Salmonella* kan indikera på kontaminering vid slakt. Om *Salmonella* påvisas i ett lymfknuteprov, identifieras djuret och ursprungsgården provtas. Vid positiva prover spärras

gården och en saneringsplan inrättas. På slakterier vidtas åtgärder för att förbättra hygienrutinerna

I handeln är det kommunerna som ansvarar för provtagningen och det tas prov av ej tillredda köttvaror såväl som beredda produkter, färdiglagad mat, ost och mejeriprodukter, glass, ägg, fisk och skaldjur.

Samtliga livsmedel där *Salmonella* påträffas bedöms som otjänliga för konsumtion och destrueras alternativt skickas tillbaka till ursprungsland om det rör sig om importerade eller införda varor. Det inleds också en undersökning för att försöka spåra smittkällan och åtgärder tas för att hindra vidare spridning.

Infektion av *Salmonella* hos människor är anmälningspliktig. Vid samtliga anmälda fall sker undersökningar för att spåra smittan samt provtagning på personer i den insjuknades närhet.

## Annan publicering

En fördjupning av resultaten från provtagningarna av dricksvatten och bekämpningsmedelsrester i livsmedel finns i respektive årsrapport som finns tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats ([www.slv.se](http://www.slv.se)).


Rapporten om dricksvatten heter "Rapportering av dricksvattenkontrollen 2009, rapport nr 11/2010".

I rapporten om bekämpningsmedelsrester, "Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2013" (Livsmedelsverket, rapport, 4/2015) finns bl.a. uppgifter om vilka kemikalier som spårats samt ursprungsland för de importerade produkter som undersökts.

Rapporten om *Salmonella*, *Campylobacter* och andra zoonoser ("Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2013"), som ges ut av SVA, Folkhälsomyndigheten och SLV en gång per år, finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats ([www.sva.se](http://www.sva.se)).

**Figur 18A**  
**Frekvensen av olika anmärkningar efter provtagning på dricksvatten 2009, procent**

*Percentage of various remarks in drinking-water*




Källa: Livsmedelsverket.


**Figur 18B**  
**Andel anmärkningar efter provtagning 2009 på dricksvatten-  
 anläggningar fördelade efter antal konsumenter på anläggningen,  
 procent**

*Percentage of remarks at drinking-water structures distributed by numbers of consumers at the structure*

Procent



Källa: Livsmedelsverket.


**Figur 18C****Andel prov med förekomst av bekämpningsmedelsrester i färsk eller frusen frukt och grönsaker, vegetabiliska konserver samt spannmål och spannmålsprodukter 2013, procent***Percentage of samples with pesticide residues in fresh or frozen fruit and vegetables, canned vegetables and cereals*

Källa: Livsmedelsverket.

**Figur 18D****Andel överskridanden av gränsvärdena för tillåtna bekämpningsmedelsrester i färska frukter och grönsaker 1996–2013. Inhemska samt importerade produkter från EU och tredje land, procent**

Percentage of exceeded limit values for residues of pesticides in fresh fruit and vegetables. Domestic and imported products respectively

Procent




Källa: Livsmedelsverket.

**Figur 18E****Fördelning av prov med eller utan halter av bekämpningsmedelsrester i stickprovskontrollen 2000–2013, procent**

Distribution of samples with or without residues of pesticides (The Swedish Monitoring of Pesticide Residues in Food)


Procent



Källa: Livsmedelsverket.

**Figur 18F****Andel positiva prov för *Campylobacter* tagna på kycklingar vid slakt 2008–2013, procent***Frequency of positive samples of Campylobacter from chicken at slaughter*


Procent



Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).


**Figur 18G****Antal rapporterade fall av human *Campylobacter*-infektion i Sverige 2003–2013***Number of reported cases of human infection caused by Campylobacter in Sweden*

Antal




Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).



**Figur 18H****Antal besättningar av olika djurslag som infekterats av *Salmonella* 2008–2013***Number of herds of different kind of animals infected by Salmonella*

Inga siffror redovisas för fåren år 2012 och 2013 samt för svinen 2013.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

**Figur 18I****Antal rapporterade humanfall av *Salmonella*-infektion i Sverige 2003–2013***Number of reported cases of human infections of Salmonella in Sweden*

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

**Tabell 18.1****Antal dricksvattenanläggningar med anmärkning uppdelat på typ av anmärkning 2009***Number of drinking-water structure with remarks distributed by type of remark*

Typ av anmärkning	Konsumenter per anläggning									
	<50		50–499		500–5 000		>5 000		Totalt	
	Antal anläggningar	Procent	Antal anläggningar	Procent	Antal anläggningar	Procent	Antal anläggningar	Procent	Antal anläggningar	Procent
Mikrobiologiska (hälsomässiga)	58	2,5	69	5,3	31	5,7	11	4,3	166	3,8
Kemiska (hälsomässiga)	40	1,7	41	3,1	6	1,1	6	2,4	93	2,1
Kemiska (estetiska, tekniska)	45	1,9	66	5,1	37	6,8	23	9,1	171	3,9
Antal anläggningar med anmärkning <sup>1</sup>	127	5,5	152	11,7	56	10,3	32	12,6	367	8,3
Antal anläggningar, totalt	2 312		1 304		545		254		4 415	

1) Samtliga anläggningar som haft anmärkning, en del anläggningar har haft flera anmärkningar.

Källa: Livsmedelsverket.

**Tabell 18.2****Resultat av det svenska kontrollprogrammet för pesticidrester i livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 2013***Results from the Swedish Monitoring of Pesticide Residues in Food*

Livsmedel	Antal prov	Inga halter	Halter <MRL <sup>1</sup>	Halter >MRL <sup>1</sup>
Färska och frysta frukter	893	198	683	12
Färska och frysta grönsaker	496	277	216	3
Spannmål och spannmålsprodukter	241	175	64	2
Övrigt (t.ex. juice, konserver, torkat samt processat)	77	53	23	1
Vin	30	14	16	–
Barnmat (färdiga rätter, drycker, frukt och grönsakspuréer samt välling)	37	37	–	–
Animaliska produkter (smör, svin-, nöt- och kycklinglever, kycklingkött, ägg och honung)	62	62	–	–

1) MRL=Maximum Residue Limit.

Källa: Livsmedelsverket.

**Tabell 18.3**  
**Sammanfattning av prover med resthalter av**  
**pesticider i frukt och grönsaker som tagits**  
**under 2013 efter ursprung**

*Summary of samples with residues of pesticides in fruits and vegetables, taken by origin*

Ursprung	Antal prov	Halter>MRL <sup>1</sup>
Inhemska	238	–
EU (exkl. Sverige)	431	2
Tredje land	780	13

1) MRL=Maximum Residue Limit.

Källa: Livsmedelsverket.

**Tabell 18.4**  
**Resultat från provtagning och analys efter *Campylobacter* 2000–2013**

*Results from sampling and analysis of Campylobacter*

	Antal prov (Antal positiva prov)						
	2000	2005	2008	2010	2011	2012	2013
<i>Provtagning på slakteri</i>							
Fjäderfä	4 222 (682) <sup>1</sup>	2 974 (393)	2 398 (298)	3 357 (444)	2 788 (357)	2 346 (217)	3 046 (267)
<i>Provtagning i butik</i>							
Nöt	1 543 (0)	–	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>
Fjäderfä	858 (80)	57 (1)	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>
Preparerad mat	39 (0)	271 (0)	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>
Övrigt	328 (0)	209 (2)	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>	.. <sup>2</sup>

1) Ej jämförbar med värden från 2003 eller senare p.g.a. förändrad provtagning.

2) För få prover. Redovisas ej.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

**Tabell 18.5****Resultat av det svenska kontrollprogrammet för *Salmonella* efter provtagning i olika led i livsmedelsproduktionen under åren 2000–2013***Results for Salmonella in the Swedish Reporting and Monitoring system in different parts of the foodstuff production*

	Antal prov (Antal positiva prov)					
	2000	2005	2010	2011	2012	2013
<i>Foder</i>						
Kvarnar och blandningar (HACP <sup>1</sup> )	8 336 (59)	8 409 (25)	9 197 (44)	8 735 (52)	8 747 (36)	8 735 (33)
Animaliskt ursprung (inkl. miljöprover)	9 004 (140)	1 939 (1)	2 074 (4)	2 055 (7)	2 200 (4)	1 289 (3)
Vegetabiliskt ursprung (inkl. miljöprover)	1 843 (44)	3 052 (67)	4 142 (32)	3 842 (20)	3 880 (17)	2 697 (18)
<i>Provtagning på slakteri</i>						
Nöt (slaktkroppar)	3 400 (1)	3 297 (1)	3 610 (2)	3 432 (1)	3 375 (0)	3 475 (2)
Nöt (lymfknutar)	3 411 (4)	3 297 (2)	3 522 (5)	3 372 (5)	3 364 (8)	3 522 (3)
Svin (slaktkroppar)	6 733 (1)	5 764 (3)	5 905 (0)	5 765 (0)	5 317 (0)	5 379 (1)
Svin (lymfknutar)	6 706 (13)	5 747 (8)	5 958 (9)	5 692 (8)	5 301 (3)	5 407 (3)
Fjäderfä (halsskinn)	3 882 (0)	3 643 (0)	5 746 (1)	5 698 (0)	5 153 (1)	4 900 (0)
<i>Provtagning på styckningsanläggning</i>						
Nöt och svin	4 454 (1)	4 119 (0)	4 236 (0)	4 757 (0)	5 965 (0)	4 823 (0)
Fjäderfä	1 074 (0)	1 014 (0)	1 405 (1)	1 095 (0)	903 (0)	927 (0)
<i>Rapportering från kommuner</i>						
Nöt och fläsk	2 834 (1)	1 820 (5)	313 (0)	187 (0)	– –	216 (0)
Fjäderfä	374 (1)	196 (8)	57 (0)	75 (0)	69 (0)	133 (0)
Övriga djurslag	28 (0)	– –	– –	– –	– –	22 (0)
Ägg och äggprodukter	50 (0)	34 (0)	20 (0)	9 (0)	– –	12 (0)
Ost och mejeriprodukter	298 (0)	63 (3)	50 (0)	58 (0)	60 (0)	27 (0)
Fisk- och skaldjursprodukter	688 (0)	379 (0)	74 (0)	114 (1)	75 (1)	70 (0)
Frukt och grönsaker	655 (0)	619 (7)	68 (0)	147 (0)	116 (0)	80 (0)
Glass och efterrätter	868 (0)	596 (0)	14 (0)	5 (0)	5 (0)	14 (0)
Preparerad mat, övrigt	3 744 (1)	4 008 (0)	642 (7)	593 (0)	474 (1)	612 (5)
<i>Summa från kommuner</i>	9 539 (3)	7 715 <sup>2</sup> (23)	1 238 <sup>2</sup> (7)	1 188 <sup>2</sup> (1)	799 <sup>3</sup> (2)	1 186 (5)

1) Hazard Analysis of Critical Control Points.

2) Exklusive Övriga djurslag.

3) Exklusive Nöt och fläsk, Övriga djurslag samt Ägg och äggprodukter.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).