

Växtskyddscentralen

## Hej!

**Uppsala 23 maj 2019**

Nu går det fort i grödornas utveckling och man behöver vara uppmärksam på att utvecklingsstadiet kan ha förändrats markant sedan förra veckan. På många håll ser vi att flaggbladet börjat sticka fram hos höstvetet. Vi ser att vinden fört med sig en del vingade bladlöss över Östersjön samtidigt finns det gott om plats för bladlössen i våra häggar så inflygning därifrån har inte kommit igång än. Hur ser det ut med bladlöss hos dig?

Trevlig vecka och lycka till!

## Graderingar vecka 22, måndag 27 maj.

**Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 28 maj.** Läs av regnmätare och rapportera in på höstvete om du graderar det, annars vårsäd.

Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.

### Höstvete:

**Mjöldagg, bladfläckar (svartpricksjuka, vetets bladfläckssjuka, brunfläcksjuka), brunrost, gulrost.**

### Havre och vårvete:

**Bladlöss** Graderingsmetod kan du läsa om under vårkorn nedan.

Vid 1,5-bladstadiet (DC 11) är det dags att göra en **riskbedömning för fritfluga**. Riskvärderingsmallen finns på [Graderarinformation](#). Övervintrande populationen bedöms som *stor*.

Västerås, Enköping, Uppsala, Borlänge, Tullinge uppnådde 90 daggrader för mer än 2 dagar sedan. Edsbyn har inte nått upp till 90 daggrader än.

**I Havre bedöms även primärangrepp av bladfläcksjuka** Instruktioner finns under vårkorn nedan.

### Råg:

**Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost.**

**Trips:** Granska 5 strån på fem ställen i rutan. Drag försiktigt bort översta bladslidan och undersök strået, axet och insidan av bladslidan. Endast föräldragenerationen, som är svartbruna, räknas. Ange trips i medeltal per strå.

Trips avräknas endast i DC 43–53.

**Rågvete:**

**Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost.**

**Vårkorn:**

**Bladlöss.** Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per strå (I dagsläget räknar du löss på huvudskottet och dess vidhängande blad). Bladlössen kan sitta under markytan vid torrt väder så dra försiktigt upp plantor och räkna där. Skriv gärna en kommentar om var eventuella löss satt.

**Primärangrepp av bladfläcksjuka.** Räknas **en** gång när grödan är i DC 13–22. Räkna friska respektive angripna plantor på 0,5 radmeter på fem platser i rutan. Angreppen hittas nästan alltid på det först uppkomna bladet men ibland på koleoptilen, det vill säga det hölje som skyddar första bladet Om du redan har graderat primärangrepp är det dags för gradering av bladfläck- och sköldfläcksjuka på 50 blad. Ange i %.

**Våroljeväxter:**

**Jordloppor.** Graderingen görs i DC 10–13 på 25 plantor vid fem olika stationer i den obesprutade rutan. På baksidan av graderingsprotokollet finns en mall för klassificeringen av skador. **Skriv en kommentar om bekämpning gjorts i fältet och/eller rutan.**

**Notera om du ser kålmal**

**Ärter och åkerböna:**

**Bladmögel.** Gradera fem plantor på fem platser i rutan. Ange angripna plantor i procent (såvida inte fler än 70 % av plantorna är angripna; ange då andel angripna blad).

Vänliga hälsningar

Lina, Anders och Kristian

[vsc.uppsala@jordbruksverket.se](mailto:vsc.uppsala@jordbruksverket.se)

[lina.norrlund@jordbruksverket.se](mailto:lina.norrlund@jordbruksverket.se) 072-222 68 23

[anders.lindgren@jordbruksverket.se](mailto:anders.lindgren@jordbruksverket.se) 070-662 18 85

[kristian.barck@jordbruksverket.se](mailto:kristian.barck@jordbruksverket.se) 073-401 52 97



**Ovan:** Havrebladlöss som uppförkas genom att föda levande ungar

**Till höger:** Vingad havrebladlus

