

## Veckorapport v 35

2017-08-30

### Rapsjordloppa - Skålfångster - Höstraps, H och I län, hösten 2017

Växtskyddscentralen i Kalmar följer inflygningen av rapsjordloppor till rapsfält både i Kalmarområdet, på Öland och på Gotland. Ännu så länge förekommer bara enstaka rapsjordloppor i observationsfälten, däremot förekommer det mycket kålbladstekel i en del fält.

Rapsjordlopporna angriper höstrapsfälten dels genom att de vuxna individerna gör gnagskador på bladen och dels genom att larverna minerar stjälkarna. Oftast förorsakas den alvarligaste skadan av larverna som genom sitt gnag inne i stjälkarna gör plantorna känsligare för utvintring.

Riktvärde för **bekämpning vid gnagskador**: 10 % uppäten bladyta.

**Bekämpningströskel larvskador**: 50-(100) rapsjordloppor/10 dm<sup>2</sup> skålyta i ackumulerad fångst under en treveckorsperiod.

Bekämpning utförs för att förhindra äggläggning. Det tar ca 10 dagar från det att rapsjordlopporna har kommit in i fältet tills det att äggläggningen startar.

**Bekämpningstidpunkt**: Inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Nedan finns resultatet av första avläsningarna av gulsålfångsterna.

Fält	Utv.stad senaste avläsn.	Antal rapsjordloppor/10dm <sup>2</sup> och dygn							Ackumulerad fångst/10dm <sup>2</sup>
		28/8							
<b>Kalmar</b>									
Läckeby	DC09-10	-							
Ljungbyholm	DC09-10	0							0
Bjursnäs	DC 09	2,6							7,8
Christinelund	DC09-10	0,8							2,4
Mönsterås	05	-							
<b>Öland</b>									
S. Möckleby	DC05	0							0
Gettlinge	DC 05	0							0
Bjärby/ Kastlösa	DC09-10	0,4							1,2
Karlevi	DC 05	3,1							9,2
Långlöt	DC10-11	0,3							1,3
Laxeby	DC09-10	0,3							1,3
Hörninge	DC10-11	0							0
Vanserum	DC09-10	-							
<b>Gotland</b>									
Linde	DC 12	0,75							5,2

Utvecklingsstadiet: 05= rapsfröet gror, 09= rapsen på väg upp, 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12= 2 örtblad etc.

Gunnel Andersson



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden