

Nr 4. Efterverkan av ogräsmedel

En del ogräsmedel har verkan på efterföljande gröda, speciellt gäller detta vid sådd efter en utvintrad gröda som har höstbehandlats. I tabellen listas begränsningar i grödval och rekommenderade åtgärder som gäller fram till dess att en valfri lantbruksgröda (VFL) kan odlas. Dessa gäller oavsett dos, om inte annat anges. Hänvisningar se sidan 2.

Höst 2014	Vår 2015	Höst 2015	Vår 2016	Höst 2016	
Ogräsbekämpning i höstsäd	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsäd	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?	
1. Atlantis	h)		VFL	VFL	
2. Bacara, upp till 1,25	b)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL	
3. Cougar, upp till 1,5	a)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL	
4. Bacara/Cougar +		+ Hussar	k)	VFL	
5. Bacara/Cougar +		+ Monitor	Plöj före höstoljevaxter.	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.	VFL
6. Boxer/Roxy	VFL				
7. Event Super	VFL				
8. Lexus	Endast vårvete.		i)	VFL	VFL
9. Diflanil	p)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter		
10. Legacy	VFL efter plöjning Vårkorn och vårvete efter harvning		Harva noga och djupt före höstoljevaxter		
		11. Ally/Ally Class	f)	g)	VFL
		12. Atlantis	k)	VFL	
		13. Attribut Twin/ Chekker Power	l)	VFL	
		14. Bacara	q)	VFL	
		15. Broadway	VFL		
		16. Caliban Duo	Plöj före höstoljevaxter	VFL	
		17. CDQ	r)	r)	VFL
		18. Diflanil	q	VFL	
		19. Legacy	q	VFL	
		20. Event Super	VFL		
		21. Hussar	k)	VFL	
		22. Monitor	n)	Grönsaker och s-betor kan inte odlas.	VFL
Ogräsbekämpning i höstoljevaxter	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/våroljevaxter	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
23. Butisan Top	c)		Direktsådd av höstsäd kan ske.	VFL	
24. Kerb	d)		Plöj före höstsäd på lerfri jord.	VFL	
25. Nimbus	e)		VFL		
26. Centium	s)		VFL		
		27. Butisan Top	Direktsådd av höstsäd kan ske.	VFL	
		28. Nimbus	o)	VFL	
		29. Fox	j)	VFL	
		29. Galera	Stråsäd, höstoljevaxter	m)	VFL

Hänvisning i tabellen på sid 1:

- a) Normalt kan vårvede eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning. Våroljeväxter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före sådd av vårvede eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.
- b) Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sättas. Harvning krävs före vårvede, havre och morötter. Plöjning krävs före våroljeväxter och klöver till frö. Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.
- c) Om behandling i augusti; VFL (inte sockerbetor) efter normal jordbearbetning, 5-10 cm djup. Undvik stråsäd på lätta jordar. Om bekämpning i september; kan endast våroljeväxter, lin, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas.
- d) Sådd av raps, majs, ärter, morötter, bönor eller lök kan göras. Inte stråsäd eller sockerbetor
- e) Om behandling i augusti; VFL (inte sockerbetor eller lin) efter en normal jordbearbetning, 5-10 cm djup. Undvik stråsäd, framförallt havre, på lätta jordar. Bäst alternativ är våroljeväxter
- f) Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan inte odlas.
- g) Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, majs eller lin kan odlas. Sockerbetor kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas.
- h) Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvede sås om det har gått minst 2 veckor efter en behandling med Atlantis.
- i) På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor och majs odlas.
- j) Minst 30 dagar bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av ny oljeväxtgröda. Om fältet plöjs kan oljeväxterna sås direkt utan väntetid. Minst 1 år bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av sockerbetor och ärter. Om fältet plöjts kan sockerbetor sås efter 100 dagar och ärter efter 150 dagar.
- k) Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter normala förhållanden.
- l) Plöj innan sådd av höstoljeväxter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan påverkas och plantantalet reduceras.
- m) Växtmaterial från en gröda som har behandlats med Galera och som inte har brutits ned kan skada en efterföljande känslig gröda, t ex ärt, bönor, lupin, potatis, morötter, sallat samt övriga baljväxter, korgblommiga och flockblommiga växter.
- n) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstoljeväxter.
- o) Lätt bearbetning ska utföras och sådd av höststråsäd tidigast 3 månader efter behandling.
- p) Vårkorn, ärter, bönor eller majs kan normalt direktsås. Vårvede, havre, klöverfrö och morötter kräver harvning. Våroljeväxter och potatis kräver plöjning. Lökväxter och betor bör undvikas.
- q) Harva noga och djupt före sådd av höstoljeväxter. Vid dos överstigande 0,3 Bacara alternativt 0,1 Diflanil/Legacy plöj före höstoljeväxter.
- r) Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbetor, majs och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.
- s) Efter harvning; Vårraps, ärter, bönor, majs och potatis. Efter plöjning; vårvede, korn, havre, sockerbetor, lin och lök.