

Veckorapport – Västra Götalands län vecka 36, 2018

Gulskålsfångster i höstraps

Gulskålar placerats ut i höstrapsfält på cirka 30 platser runt om i Västra Götaland som vi och Hushållningssällskapetets rådgivare tömmer varje vecka.

Inflygningen av **rapsjordloppa** pågår i de flesta områden och fångstskålar är utplacerade för att följa förekomsten och värdera behovet för bekämpning riktad mot rapsjordloppans larver. Där inflygningen har börjat är det hittills bara ett större antal rapsjordloppor i fyra fält (se tabell 1 nedan och tabell 2 för specifika områden).

Tabell 1. Antal höstrapsfält sorterade efter ackumulerad fångst av rapsjordloppa (ackumulerad fångst/10 dm²) samt medelvärden för denna och föregående vecka. *Bekämpningströskel (se mer i nästa stycke)

	0	0.01–14	15–30	30–50	50–100*	Medel	Medel föregående vecka
Rapsjordloppa	7	16	4	5	4	23	7

Fångstskålarna kan inte användas för att belysa gnagskadorna som orsakas av den vuxna rapsjordloppan, utan där måste en gradering av bortgnagd bladyta ske i det enskilda fältet. Hittills är det enstaka plantor med gnagskador i ett par fält och de är inte uppe i riktvärdet på 10 % uppäten bladyta.

Riktvärde gnagskador: i medeltal cirka 10 % uppäten bladyta, fram till 2-4 örtblad är utvecklade.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde. Har du ingen skål följ alternativ metod i vårt växtskyddsbrev [Nr. 24. Bevaka rapsjordloppa och kålbladstekel i höstrapsen](#)

Ett fåtal vuxna individer av **kålbladstekel** har fångats i gulskålarna på flera platser, i två fält har enstaka larver av kålbladstekel observerats. För **kålbladstekel** är bekämpningströskeln 1 larv per planta. Ingen bekämpningströskel finns för **kålmal**, men då larverna är mycket mindre som fullvuxna gör de inte samma skada som kålbladstekel.

I flera fält har **kålbladlus** hittats, som mest en lus per planta. De har historiskt inte varit en skadegörare på hösten och den virus spridande **persikbladlusen** har inte påträffats i fält.

Några fall av snigelskador

Efter en tids regn har det nu kommit in några rapporter om snigelskador. Inga stora skador men med fortsatt regn kommer sniglarna att aktivera sig mer så håll koll i fälten. De flesta höstrapsfält har plantor med ett eller två örtblad. Största faran för snigelskador är över när höstrapsen utvecklat tre örtblad.

Tabell 2. Skålfångster i Västra Götaland 2018. På en del platser har skålarna satts ut denna vecka och ingen avläsning finns.

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål			Ackumulerad fångst / 10 dm ²
		Antal rapsjordloppor / 10 dm ² och dygn			
		21/8-23/8	28/8	3-4/9	
Grästorp 1	13	-	0	0	0
Grästorp 2	-	0	0,9	*	3
Flakeberg	13	0,3	0	0	1,3
Järpås	14	6,2	6,8	2	89 ^a
Lidköping 1	12	0	0	0,5	3

Tabellen fortsätter på nästa sida

Lidköping 2	-	0	0,9	0		6
Kålland	-	-	-	0		0
Lundsbrunn 1	12	0	0	6		36
Lundsbrunn 2	-	-	0,4	3,7		28
Vinninga	12	0,4	0,2	7,8		50
Axvall	12	0,6	0	0,8		9
Vara 1	13	0,2	0	0,2		2
Vara 2	-	0	0,6	2,3		18
Vara 3	-	0	2,6	12,7		94
Ardala	12	1	0,7	3		28
Skövde 1	12	0	0	2		12
Skövde 2	12	-	0,5	7		44
Moholm 1	13	0,2	0	8		49
Moholm 2	12	0	0	0,5		3
Väring	12	0	0	2,5		10
Hjo	12	-	0,5	0,7		6
Tidaholm	12	-	0,5	1,2		9
Kvänum	14	-	0	0		0
Norra Vånga	-	0	0,3	0		2
Längjum	-	0	2	6		50
Broddetorp	-	0	0,3	0		2
Falköping	-	0	0	2,3		14
Floby	-	-	2	2		28
Mariestad	-	-	0	0,6		4
Götene	-	-	0	0		0
Brålanda	10	0	0	0		0
Mellerud 1	12	0	0	0		0
Mellerud 2	12	0	0	0		0
Sollebrunn	12	-	0,3	3,1		24

*Vi kompletterar med skålfångster senare i veckan. ^aHar bekämpats

Växtskyddscentralen Skara



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden