

Ogräsbrev från Växtskyddscentralerna

20130423

Nr 4. Efterverkan av ogräsmedel ersätter ogräsbrev nr 4 från 20130409

Ny information om Diflanil och Legacy.

En del ogräsmedel har verkan på efterföljande gröda, speciellt gäller detta vid sådd efter en utvintrad gröda som har höstbehandlats. I tabellen listas begränsningar i grödval och rekommenderade åtgärder som gäller fram till dess att en valfri lantbruksgröda (VFL) kan odlas. Dessa gäller oavsett dos, om inte annat anges. Hänvisningar se sidan 2.

Höst 2012	Vår 2013	Höst 2013	Vår 2014	Höst 2014
Ogräsbekämpning i höstsäd	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsäd	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
1. Atlantis	h)		k)	VFL
2. Bacara, upp till 1,25	b)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL
3. Cougar, upp till 1,5	a)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL
4. Bacara/Cougar +		+ Hussar	k)	VFL
5. Bacara/Cougar +		+ Monitor	Plöj före höstoljevaxter.	Grönsaker och s-betor kan ej odlas.
6. Boxer	VFL			
7. Event Super	VFL			
8. Lexus	Endast vårvete.		i)	i)
9. Diflanil	a)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	
10. Legacy	p)		Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	
		11. Ally/Ally Class	f)	g)
		12. Atlantis	k)	VFL
		13. Attribut Twin	l)	VFL
		14. Bacara/Cougar	Harva noga och djupt före höstoljevaxter.	VFL
		15. Broadway	VFL	
		16. CDQ SX	q)	q)
		17. Diflanil	n)	VFL
		18. Legacy	n)	VFL
		19. Event Super	VFL	
		20. Hussar	k)	VFL
		21. Lexus	i)	i)
		22. Monitor	n)	Grönsaker och s-betor kan ej odlas.
Ogräsbekämpning i höstoljevaxter	Om utvintring – vad kan odlas?	Ogräsbekämpning i höst-/vårsljevaxter	Vad kan odlas?	Vad kan odlas?
23. Butisan Top	c)		Direktsådd av höstsäd kan ske.	VFL
24. Kerb	d)		Plöj före höstsäd på lerfri jord.	VFL
25. Nimbus	e)		VFL	
		26. Butisan Top	Direktsådd av höstsäd kan ske.	VFL
		27. Nimbus	o)	VFL
		28. Fox	j)	VFL
		29. Galera	Stråsäd, höstoljevaxter	m)

Hänvisningar i tabellen på sid 1:

- a) Normalt kan vårvete eller vårkorn direktsås. Havre kräver harvning och potatis plöjning. Vårolja växter, ärter, bönor och betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör marken alltid harvas före sådd av vårvete eller vårkorn, plöjas före sådd av havre.
- b) Normalt kan vårkorn, ärter, bönor, majs eller solros direktsås och potatis sättas. Harvning krävs före vårvete, havre och morötter. Plöjning krävs före vårolja växter och klöver till frö. Betor bör undvikas. Har behandlingen gjorts sent på hösten med hög dos på lättjord samt vintern varit lång och kall så bör alltid direktsådd ersättas med harvning och vanlig sådd.
- c) Om bekämpning i augusti; VFL (ej sockerbeter) efter normal jordbearbetning, 5-10 cm djup. Undvik stråsäd på lätta jordar. Om bekämpning i september; kan endast vårolja växter, lin, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas. Korn eller vårvete kan odlas efter en noggrann kultivering eller plöjning till 10-15 cm djup.
- d) Sådd av raps, majs, ärter, morötter, bönor eller lök kan göras. Ej stråsäd eller sockerbeter.
- e) Om bekämpning i augusti; VFL (ej sockerbeter eller lin) efter en normal jordbearbetning, 5-10 cm djup. Undvik stråsäd, framförallt havre, på lätta jordar. Bäst alternativ är vårolja växter.
- f) Stråsäd kan odlas. Höstraps kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Senap kan ej odlas.
- g) Stråsäd med/utan insådd av gräs och klöver, höst- och vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, majs eller lin kan odlas. Sockerbeter kan odlas om max. 40 g Ally Class använts. Grönsaker och prydnadsväxter kan ej odlas.
- h) Efter en lättare jordbearbetning kan vårkorn eller vårvete sås om det har gått minst 2 veckor efter en behandling med Atlantis.
- i) På hösten efter en behandling kan, efter plöjning, stråsäd med eller utan insådd och höstraps sås. Våren året efter kan stråsäd med eller utan insådd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbeter och majs odlas.
- j) Minst 30 dagar bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av ny oljeväxtgröda. Om fältet plöjs kan oljeväxterna sås direkt utan väntetid. Minst 1 år bör förflyta mellan användning av Fox och direktsådd av sockerbeter och ärter. Om fältet plöjts kan sockerbeter sås efter 100 dagar och ärter efter 150 dagar.
- k) Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps, harvning efter normala förhållanden.
- l) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstolja växter. Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men kan påverkas och plantantalet reduceras.
- m) Växtmaterial från en gröda som har behandlats med Galera och som inte har brutits ned kan skada en efterföljande känslig gröda, t ex ärt, bönor, lupin, potatis, morötter, sallat samt övriga baljväxter, korgblommiga och flockblommiga växter.
- n) Grundlig bearbetning av jorden alternativt plöjning innan sådd av höstolja växter.
- o) Lätt bearbetning ska utföras och sådd av höststråsäd tidigast 3 månader efter en behandling.
- p) Vårkorn och vårvete kan sås efter grundlig harvning. Valfri gröda kan sås efter en plöjning.
- q) Samma år kan stråsäd med/utan insådd av gräs/klöver och höstraps sås. Senap kan inte odlas samma år. Året efter kan även vårraps, rybs, potatis, ärter, bönor, sockerbeter, majs och lin odlas. Grönsaker och prydnadsväxter kan inte odlas året efter.