

Veckorapport – Alnarp vecka 35

2016-08-30

Rapsjordloppa - Skålfångster - hösten 2016

Skålar för att följa inflygningen av rapsjordloppa har placerats ut i 21 rapsfält och inflygningen har påbörjats i en del fält. En del gnag på bladen, som kan vara orsakade av både rapsjordloppa och sniglar, syns i många fält. Dessa gnagskador kan skiljas åt genom att rapsjordloppa oftast gör små runda hål inne i bladet, medan bladgnag av sniglar är mera oregelbundna och finns oftast i kanterna.

Riktvärde gnagskador av rapsjordloppa: Mer än 10 % uppäten bladyta.

Bekämpningströskel larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst.

Regnigt väder gynnar sniglarna, håll fälten under uppsikt.

Fält	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Fångstskål								Ackumulerad fångst /10dm ²
		Antal rapsjordloppor/10dm ² och dygn								
		29/8								
Nordvästra Skåne										
Viken	13	2,4								17
Kattarp	12	1,1								8
Åstorp	12	2,4								17
Häljarp	10	0,0								0
Lund / Mellanskåne										
Löberöd	10	2,1								15
Furulund	12	1,9								13
Lund	10	0,7								1
Genarp	0	0,0								0
Kyrkheddinge	10	0,0								0
Sydvästra Skåne										
Staffanstorps	11	0,8								4
Gessie	10	0,2								1
Bodarp	12	5,3								32
Maglarp	11	1,5								9
Hemmesdynge	10	3,7								22
Skivarp	0	0,0								0
Charlottenlund	10	0,2								1
Sydöstra Skåne										
Sandby Gård	10	0,4								3
Gärnsås	10	0,8								5
Tomelilla	10	0,6								4
Nordöstra Skåne										
Kristianstad	0	0,0								0
Blekinge										
Bräkne-Hoby	10	0,2								1

Utvecklingsstadiet: 9 = hjärtbladen växer genom markytan, 10 = hjärtbladen helt utvecklade
11 = 1 örtblad, 12 = 2 örtblad o.s.v.