

Veckorapport - Skara vecka 20

Veckorapporten omfattar graderingar av prognosrutor med höst och vårrödor i Västra Götalands län (O) och Värmlands län (S). Graderingar görs i rutor där grödorna inte behandlats mot svamp eller insekter. Svampangrepp graderas på de tre översta bladen.

Vädret

Det kallare vädret har övergått i lite mildare dagstemperaturer med fortsatt nattfrost på flera håll. Nederbörd i hela regionen men mycket varierat. I medeltal 12 millimeter, variation från 7 upp till 32 millimeter. De större nederbördsmängderna är från Värmlands län.

Höstvete

DC 32 (31-37)

3 fält i S-län, 34 fält i O-län

Fortsatt svaga angrepp av **svartpricksjuka** i de flesta fält. I fyra fält finns svaga angrepp av **vetets bladfläcksjuka**. Ingen **rost** har hittats i prognosfälten. I ett fält har begynnande angrepp av **mjöldagg** hittats. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 1.

Tabell 1. Antal höstvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

Sorter: 7 Brons, 3 Elvis, 8 Julius, 3 Linus, 3 Norin, 2 Mariboss, 3 Praktik, 6 RGT Reform, 1 Okänd

	0-0,01	1 - 15	15 - 30	30 - 60	60 - 100	Medel	Medel v.19
Mjöldagg	36	1	0	0	0	0.1	0
Svartpricksjuka	16	16	5	0	0	6	8
Vetets bladfläcksjuka	33	4	0	0	0	0.3	0
Bladfläcksvampar	16	16	5	0	0	6	7
Brunrost	37	0	0	0	0	0	0
Gulrost	37	0	0	0	0	0	0

Rågvete

DC 32 (32-37)

6 fält i O-län

Begynnande angrepp av **bladfläckssvampar** i ett fält. I tre fält finns angrepp av **sköldfläckssjuka**, dock inte på de tre översta bladen. Ingen **rost** eller **mjöldagg** har rapporterats. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 2.

Tabell 2 Antal rågvetefält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka.

Sorter: 1 Cappricia, 3 Empero, 1 Trefl, 1 Okänd

	0-0,01	1 - 15	15 - 30	30 - 60	60 - 100	Medel	Medel v.19
Mjöldagg	6	0	0	0	0	0	0
Bladfläcksvampar	5	1	0	0	0	0.5	0
Sköldfläckssjuka	6	0	0	0	0	0	1
Brunrost	6	0	0	0	0	0	0
Gulrost	6	0	0	0	0	0	0

Råg

DC 41 (37-43)

5 fält i O-län

I ett fält finns svaga angrepp av mjöldagg. Inga angrepp av **sköldfläcksjuka** eller **brunrost**. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 3. I flertalet fält har det varit för tidigt att gradera **trips**. I två fält har trips graderas, som mest 0,5 trips per strå.

Tabell 3. Antal rågfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

Sorter: 1 KWS Binnito, 1 KWS Livado, 1 SU Performer, 2 Okända

	0-0,01	1 - 15	15 - 30	30 - 60	60 - 100	Medel	Medel v.19
Mjöldagg	4	1	0	0	0	0.4	0
Sköldfläcksjuka	5	0	0	0	0	0	0
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0

Höstkorn

DC 41 (37-43)

7 fält i O-län

I två fält förekommer **mjöldagg**, varav ett med ett kraftigare angrepp. I ett fält har begynnande angrepp av **kornets bladfläcksjuka** hittats. Se översikten över graderingsresultaten i tabell 4. Avläsning av **trips** har gjorts i två fält, som mest 0,1 trips per strå.

Tabell 4. Antal höstkornfält sorterade efter angreppsgrad av olika sjukdomar (% angripna blad 1-3) samt medelvärden för denna och föregående vecka

Sorter: 1 Frigg, 2 Mercurio, 1 Trooper, 1 Wootan, 2 Okända

	0-0,01	1 - 15	15 - 30	30 - 60	60 - 100	Medel	Medel v.19
Mjöldagg	5	1	0	0	1	10	15
Kornets bladfläcksjuka	6	1	0	0	0	0.3	0
Sköldfläcksjuka	7	0	0	0	0	0	0.7
Ramularia	7	0	0	0	0	0	0
Kornrost	7	0	0	0	0	0	0

Vårstråsäd

I vårstråsäd har ingen svamp hittats och inga bladlöss. Daggraderna för fritfluga har på flera platser gått över 90 daggrader.

Inga eller mycket svaga **primär angrepp** av **havrens-** och **kornets bladfläcksjuka**.

Vårvete

DC 12 (12-13)

1 fält i S-län, 5 fält i O-län

Vårkorn

DC 13 (10-21)

2 fält i S-län, 16 fält i O-län

Havre

DC 12 (11-13)

3 fält i S-län, 12 fält i O-län

Åkerböna

DC 13 (12-31)

8 fält i O-län

Gnag av den **randiga ärtviveln** förekommer i alla fält, och i många finns gnag på alla blad. Inga **svampar**, **bladlöss** eller **bönsmyg** har påträffats.

Höstraps

DC 65 (65-65)

9 fält i O-län

Alla höstrapsfält är i full blom. Antalet rapsbaggar i höstrapsfälten fortsätter att minska från 2,2 föregående vecka till 1 rapsbagge per planta i medeltal. I två av åtta fält hittas blygrå rapsvivel, som mest 0,3 per planta.

Växtskyddcentralen Skara



Europeiska jordbrukstonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden