

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 18 juli 2017

Den här veckan gör vi vår sista gradering, så vi hoppas att du är på tårna!

På många håll börjar de nedersta bladnivåerna i stråsåden att vissna, men det löses enkelt på följande sätt: Byt ut det vissna bladet till ett blad från samma bladnivå på en annan planta. Om du kan avgöra vilken sjukdom som förekommit på det vissna bladet kan du ta med det i graderingen.

Kålbladlus är vi intresserade av att få in graderingar av; även av dig som inte har graderat våroljeväxter den här säsongen! Kanske känner du till något våroljeväxtfält som du kan ta en vända i? Graderingen behöver alltså inte vara från en obehandlad ruta.

Graderingar vecka 30. Det är inte nödvändigt att få in resultaten till tisdag kl. 12 de kommande veckorna. Vi ser hellre att din sista gradering görs någon dag senare än att den inte blir gjord alls.

Våroljeväxter:

Kålbladlus räknas på 20 plantor på fem platser i rutan (eller i fältet om ingen ruta finns). Notera även datum för graderingen samt utvecklingsstadium.

Höstvete:

Mjöldagg, bladfläckar (ange vilka), **brunrost, gulrost, bladlöss**. Skicka in **axprover för vetemygga**. Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag. Senaste tidpunkt att ta axprov är 4-5 veckor efter axgång.

Stråknäckerprover: Gräv upp 50 plantor försiktigt och se till att få med rötterna. Klipp av strået ca 25 cm från basen och ta bort lös jord. Rötterna får inte ruttna så förvara dem torrt och lämna till oss vid tillfälle. Märk proverna med fältnummer, gröda och datum.

Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost, löss.

Om kornet har gått i ax görs en uppskattning av **flygsot**. Räkna antalet angripna plantor i en ruta på 1x10m på några olika ställen i fältet. Räkna ut antalet angripna plantor per kvadratmeter och notera i anteckningsrutan.

Havre: Mjöldagg, bladfläckar, kronrost (notera även om du ser svartrost på bladslidorna), löss. Flygsot (se instruktion under Korn).

Vårvete:

Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. Tripsskador graderas *en gång* i DC 71–79.

Gradera minst 25 strån och ange procent skadade. Som skada räknas när mer än halva bladslidans omkrets är gulfärgad. Skicka in **axprover för vetemygga** vid DC 75 (när kärnan nått full längd). Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.

Ärter: Ingen gradering aktuell men **baljprover** ska tas in från den obehandlade rutan. När baljorna är fullmatade, helst 1-2 veckor före skörd, så tar du baljor från 50 plantor. Om du har fler än 8 baljor per planta kan det räcka med att du tar från 25 plantor. Lägg baljorna i en plastpåse och frys in direkt. *Provet ska märkas med antal plantor*. Lämna till oss vid tillfälle eller meddela oss om vi ska komma och hämta dem.

Åkerböna: Ingen gradering aktuell men Växtskyddscentralen vill ta in **baljprover** från den obehandlade rutan före skörd, så meddela oss var fältet ligger.



Om en planta är angripen av kålbladlöss brukar det synas tydligt; de sitter i knopp- och blomregionen av den angripna plantan (bilden till vänster). Men de är inte blåa utan snarare blyertsgrå (bilden till höger).

Vänliga hälsningar

Lina, Anders, Hanna och Sanna

E-post: vsc.uppsala@jordbruksverket.se

lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

hanna.olsson@jordbruksverket.se

073-404 25 90

sanna.krugerpersson@jordbruksverket.se

076-607 01 63