

Odlas honungsört som klöverfröodlare



Ett stråk med honungsört intill ett fält med rödklöverfrö. Foto: Thorsten Rahbek Pedersen

Honungsört, som också kallas honungsfacelia, är en ettårig växt med blå eller lila blommor som blir ca 70 cm hög. Den har god marktäckande och ogräskvävande förmåga. Den är inte kvävefixerande och har en god förmåga att ta up växtnäring. Den har inga kända växtföljdssjukdomar. Honungsört blommar ca 8 veckor efter sådd.


Etablering, gödsling och ogräsbekämpning: Honungsört trivs på alla jordtyper. Den kan sås på lucker jord från och med april. Honungsört är mörkergroende och bör sås på ca 2 cm djup. Det är viktigt att fröet inte släpps för ytligt. Om man släppt ner fröet på markytan måste man både harva ner fröet lätt och därefter välta. Det räcker inte bara att välta. Utsädesmängden är cirka 10 kilo per hektar. Om du radsår bör radavståndet vara ca 12 cm. Honungsört är en ganska anspråkslös gröda men ge den gärna en startgiva på 20-30 kg kväve per hektar.

Honungsörten dödas av behandling med Basagran M75 medan den klarar av en behandling med Fokus Ultra eller Select.

Speciellt för rödklöverfrödlare:

Humlor och bin navigerar efter raka linjer i landskapet. Så därför helst ett stråk med honungsört på vändtegen eller i fältet. Om fältet är stort (mer än ca 8 hektar) är det en bra idé att så ett stråk i mitten av fältet för att locka bin och humlor ut i grödan. Honungsörten slås av 3-4 veckor efter full blom för att undvika problem med spillplantor. Om honungsörten sås i april brukar nedhuggningen kunna ske när rödklövern närmar sig full blom. Slå inte av honungsörten direkt när de första blommorna syns i rödklövern. Ett litet stråk med honungsört konkurrerar inte nämnvärt med grödan och håller kvar humlor och bin i fältet tills rödklövern blir riktig attraktiv. När det blir dags att slå av honungsörten så gör det på kvällen så att inte insekterna skadas.

Exempel på placering av stråket med honungsört intill fältet med rödklöverfrö:



Speciellt för vit- och alsikeklöverfrödlare:

Även vitklöver- och alsikefrödlare bör så honungsört i ett hörn eller en remsa någonstans på gården. Det behöver inte vara intill fältet med klöverfrö. Man bör då så honungsörten i maj månad så att den blommar efter vit- och alsikeklöver. På sensommaren bildas de nya humledrottningarna och de så kallade vinterbina som ska säkerställa pollineringen av nästa års grödor. Om det inte finns pollen och nektar på sensommaren blir det färre humlesamhällen året efter och även honungsbinna får svårare att överleva vintern. Honungsörten slås av 3-4 veckor efter full blomning för att undvika problem med spillplantor.